

# ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

*Jürgen Schneider*

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457  
E-Mail: [schneider@albatros-tours.com](mailto:schneider@albatros-tours.com) - Homepage: [www.albatros-tours.com](http://www.albatros-tours.com)



## Kuba

**vom 08.03.2010 bis 22.03.2010**

von Klemens Steiof



# Unsere Gruppe



von links nach rechts: Andreas Thiele, Dieter Kurz, Gerlinde Kurz, Eleonore Gothe, Herbert Ehrlich, Arturo, Klemens Steiof, Ingeborg Ehrlich, Guillermo.



von links nach rechts: Dieter Kurz, Dietmar Raufuß, Gerlinde Kurz, Klemens Steiof, Eleonore Gothe, Andreas Thiele, Herbert Ehrlich.

Foto: Klemens Steiof

## Reisebericht Kuba 8.3.2010 – 22.3.2010

Teilnehmer: Ingeborg und Herbert Ehrlich (Feldbach), Eleonore Gothe (Glashütten), Gerlinde und Dieter Kurz (München), Dietmar Raufuß (Springe), Andreas Thiele (Mannheim)

Reiseleiter: Klemens Steiof (Potsdam)

Kubanischer Reiseleiter, Fahrer: Guillermo, Arturo

Örtliche Orniguides: Julius Cäsar (La Güira), Julius Cäsar der II. (Viñales), Angel (Zapata), Orlando (Zapata), Camillo (Sierra Najasa), Paulino (Cayo Coco)

Mo, 8.3.2010

### Anreise

Dem Reisebegleiter wurde bereits beim Einschecken im Flughafen Berlin-Tegel mitgeteilt, dass er leider in Madrid den Flug nach Havanna nicht erreichen kann, weil die Maschine von Berlin nach Madrid 1 ½ Stunden Verspätung haben wird. Es gäbe auch keinen anderen Flug – einzige Chance wäre eine Verspätung des Havanna-Fluges. Der flog allerdings wirklich pünktlich, so dass der Reisebegleiter zum einen in Madrid das losrollende Flugzeug von hinten sehen und schließlich den Luxus eines Madrider 4-Sterne-Hotels genießen durfte, während der Rest der Gruppe den 10 Stunden langen Flug von Madrid nach Havanna durchstehen musste.

Di, 9.3.2010

### Vormittag: La Güira NP, Nachmittag: La Güira NP

Während der Reisebegleiter zwischen einem hervorragenden Frühstücksbuffet und leckerem Mittagessen beim Spaziergang um die Ecke ein brütendes Weißstorchpärchen sah (1 Vogel beringt) und 3 Einfarbstare, war die Reisegruppe mit deutlich schlechterer Unterkunft, aber wesentlich höherer Artenvielfalt konfrontiert.

Das Hotel Mirador in San Diego de los Baños erntete wenig Beifall, um so mehr aber der örtliche Orniguide Julius Cäsar (hieß wirklich so!). Mit ihm sah die Gruppe den ersten Schwung Endemiten: **Vielfarbtodi** (Cuban Tody), **Kubawaldsänger** (Olive-capped Warbler), **Kubaklarino** (Cuban Solitaire), **Blutfleckspecht** (Cuban Green Woodpecker), **Bahamaspecht** (West Indian Woodpecker) und **Gelbkopf-Waldsänger** (Yellow-headed Warbler).

Die zwar führerlose, aber trotzdem ornithologisch befriedigte Gruppe checkte dann aber nicht in das Hotel Los Jasmines in Viñales ein, sondern wegen Ausbuchung in das einige Kilometer entfernte Rancho San Vicente. Nachts um 2 Uhr folgte der Reisebegleiter nach, der mittlerweile ebenfalls den 10stündigen Flug durchgestanden hatte.



Mi, 10.3.2010

**Vormittag: Wald südl. Viñales,  
Nachmittag: Wald nördl. (?) San  
Vicente**

Ab morgens um 7.15 Uhr (Frühstück) war die Gruppe vereint. Um 8 Uhr fuhren wir nach Viñales, um unseren 2. Orniguide einzusammeln, der auch Julius Cäsar hieß. Mit ihm fuhren wir dann weiter an eine gute Stelle für **Kubaklarino** und **Kubawaldsänger**, die Einige gestern nicht gut gesehen hatten. Beide präsentierten sich „de luxe“, neben vielen anderen schönen Vögeln wie **Streifenkopftangare** (Stripe-headed Spindalis), **Katzen-drossel** (Grey Catbird), **Blaurücken-**



(Black-throated Blue) und **Grünwaldsänger** (Black-throated Green Warbler) – trotz des recht starken Windes.

Dafür war die Nachmittagsexkursion eher Kleinvogel-unfreundlich, brachte aber **Kubatrogone** auf kurze Entfernung, und an einem kleinen Altarm **Keilschwanz-Regenpfeifer** (Killdeer) und **Gürtelfischer** (Belted Kingfisher).

Abends flogen weit über 1.000 kleine Fledermäuse aus einer Höhle in der Nähe des Hotels aus, wobei der **Buntfalke** (American Kestrel) versuchte, sich dabei zu bedienen. Anschließend leider keine Nachtschwalben oder Eulen.

Zwei Dinge liefen mit Julius Cäsar dem II. nicht rund: Erstens lamentierte er, er habe nur ein 3-Stunden-Voucher und wollte uns nur am Vormittag führen. Nach heftiger Intervention sagte er dann, dass er großzügigerweise uns doch den ganzen Tag begleiten wolle. Im Nachhinein zeigte sich aber, dass er natürlich doch ein 8-Stunden-Voucher hatte. Was für ein aufgeplusterter Schnösel! Und zweitens hat er sich am Abend tierisch über das aus seiner Sicht extrem magere Trinkgeld aufgeregt – so etwas sei ihm noch nie passiert. Dabei entsprach der Betrag fast den Empfehlungen von Guillermo: 2-3 CUC für den halben Tag/je Person (abzüglich Schnösel-Bonus). Na immerhin, feldornithologisch war er gut, und laut Guillermo ohnehin der einzige Orniguide in Viñales.

Das Hotel war o.k., in sehr schöner Anlage, wenn auch hier und da die Wasserhähne klemmten. Aber es waren ruhige Zimmer, die Klimaanlage funktionierten, und das Essen war erstaunlich gut. Insgesamt aufgrund der schönen Anlage (mit etlichen Vögeln) wohl ein guter Tausch. Direkt um die Cabañas bzw. beim Essen sahen wir die schicke **Rotfußdrossel** (Red-legged Thrush), viele **Antillengrackle** (Greater Antillean Grackle) und auch ein paar **Braunschulterstärlinge** (Tawny-shouldered Blackbird).

Vögel des Tages: Kubatrogon (natürlich!), Streifenkopftangare (einfach der Hammer!) und Kubaklarino (zwar verbesserungsfähiges Äußeres, aber Gesang und Beobachtungsnähe waren überzeugend).

Wo wir gerade beim Geld waren: 1 € ? 1,15 CUC (= Pesos convertibles)

1 CUC = 24 Pesos nacionales

Preise (im Restaurant):

Cola-Dose national (TropiCola): 1 CUC

CocaCola-Dose (aus Mexiko importiert): 1,50 CUC

Dose Bier: 1,50 CUC

1,5-l-Wasserflasche: ca. 0,80 CUC

Do, 11.3.2010

**Morgen: Straße nahe Hotel Rancho San Vicente, tagsüber Fahrt nach Zapata (mit Zigarrenfabrik in Habana)**

Wieder starker Wind heute, und das bei morgens schon 28°C und 96 % Luftfeuchte (Dietmars handlicher Wetterstation sei Dank), und so brachte die pre-Frühstücks-Morgenexkursion hinterm Hotel die Straße entlang nur eine neue Art: **Antillentaube** (Scaly-naped Pigeon) – auf größere Entfernung, aber die einzige Beobachtung auf der Tour.

Nach ausgiebigem Frühstück fuhren wir los und hatten eine längere Unterbrechung der Fahrt in der größten Zigarrenfabrik Kubas. Dort ist alles Handarbeit, rund 900 Arbeiter, jeder verdient monatlich ca. 450 Pesos nacionales + ca. 40 Pesos convertibles, also rund 50 Euronen. Die meisten Arbeiter waren mit dem Sortieren der Blätter und dem Rollen der Zigarren beschäftigt, von letzteren schaffte jeder ca. 110 Zigarren pro Tag. Täglicher Ausstoß der Fabrik: 40.000 Zigarren.

Dann ging es weiter durch eher weniger attraktive Agrarlandschaften. Süßigkeit am Nachmittag: Im Straßenverkauf entstandene Turrón (Tafel aus Milch, Honig und Erdnüssen). Am Straßenrand viele **Carolinatauben** (Mourning Dove).

Vor Ort wurden wir außerplanmäßig nicht im Hotel Playa Larga untergebracht, sondern 34 km weiter südöstlich im Hotel Playa Giron. Der Versuch, das noch zu ändern, scheiterte daran, dass Playa Larga in der Nacht von So auf Mo ausgebucht war. Aber auch dieser Hotelwechsel war eher von Vorteil, wie sich noch herausstellen sollte.

So haben wir zwar geräumige, aber insgesamt eher schlichte Cabañas ganz am Westende der Anlage bezogen – gefühlte mehrere km von Rezeption und Essensraum entfernt. (Auch das stellte sich als Vorteil heraus: Ruhe und mehr Vögel.) Und wie so üblich gab es die eine oder andere „malfunction“: Warmwasser ging nicht (3x), Licht fehlte, Klospülung kaputt, Bettlaken voller Haare... Immerhin gab es hier „pension completa“, und so haben uns die freien Biere und Cuba Libres über die sonst nicht ganz 5 Sterne genügende Ausstattung hinweggetröstet.

Hotel: Nun ja.

Vogel des Tages: Nicht so richtig.



Fr, 12.3.2010

**Vormittag:**

**Zapata/Bermejas,**

**Nachmittag:**

**Zapata/Bermejas**

Dank Klimaanlage hatten die Meisten ganz gut geschlafen. Um 6.30 Uhr gab es Frühstück, und um 7 Uhr starteten wir nach Bermejas. Es stellte sich als ein Vorteil von Playa Giron heraus, dass dieses Top-Gebiet (für Endemiten) nur rund 14 km entfernt war, so dass wir zeitig im Gelände waren.

Die Rahmenbedingungen dort waren allerdings etwas hart: 28°C, fast 90 % Luftfeuchte, und viiiiele Stechmücken!

Wir liefen mit unserem Orniguide Angel (ein Bruder von Chino – beide sind legendäre Zapata-Führer) einige Kilometer durch den Wald von Bermejas. Neben den inzwischen schon fast gewöhnlichen **Vielfarbentodis** und **Kubatrogonen** sahen wir drei endemische Erdbaubenarten: 2 nicht ganz nahe **Bahamatauben** (Key-West Quail-Dove) und 5 **Gundlachtauben** (Grey-headed Quail-Dove), die an einer Wasserstelle im Wald nacheinander zur Tränke kamen. Auch die „**Liebestauben**“ (Zenaida Dove; wer hat sich eigentlich diesen deutschen Namen ausgedacht?!) waren

sehr hübsch. Selten so für Tauben geschwitzt... Weitere interessante Arten waren **Kuba-Amazonen** (Cuban Parrot), die paarweise beobachtet wurden. Sehr allerliebst auch der **Pieperwaldsänger** (Ovenbird), der mehrfach auf dem Weg umherstolzierte und örtlich „Señorita d'el Monte“ genannt wird.

Zurück im Hotel an der Rezeption – die mussten wir wegen einiger Reklamationen aufsuchen – flog dort ein schmucker **Goldkehl-Waldsänger** (Yellow-throated Warbler) umher, auf wenige Meter Entfernung zu beobachten.

Die Mittagspause wurde unterschiedliche genutzt, und die Hitze-Aushalter wurden mit Drosseluferläufer, Prachtfregattvogel und sogar dem **Lerchenstärling** (Eastern Meadowlark) belohnt. Leider gab es erstmal in der ganzen Hotelanlage kein Wasser, so dass wir die klebrigen Sedimentschichten von Schweiß und Autan auf der Haut lassen mussten. Nach dem Mittagessen konnte aber wieder geduscht werden – und das sogar warm.

Der Nachmittag – wieder in Bermejas – war weniger erfolgreich, und das Beobachten der vorhandenen Vögel wurde etwas durch das Jogging-Programm von Angel erschwert: Der wollte nämlich in ziemlicher Eile zweimal quer durch den Wald laufen. Die Zielarten (Kubanachtschwalbe, Bienenelfe) sahen wir trotzdem nicht. Großes Lob an die Gruppe: Im Wald wurde sehr diszipliniert gearbeitet (z.B. nur geflüstert).

Relativ frühes Abendessen, denn morgen geht es früh raus.

Hotel: Jetzt hat sich jeder arrangiert. Zwar basic, aber sauber, und jeder hat air con und Warmwasser.

Vogel des Tages: Gundlachtaube (wegen der tollen Beobachtung an der Wasserstelle), gefolgt von Bahamataube (wegen der irren Kopfzeichnung) und Kuba-Amazone (natürlich!). Den Sympathiepreis bekommt der Pieperwaldsänger (total süß), ein Sonderpreis geht an den Gelbkehlwaldsänger, der zu uns in die Rezeption kam.

Sa, 13.3.10

**Vormittag: Zapata/La Turba und La Boca, Nachmittag: Zapata/Bermejas**

Mit 26°C und 80 % Luftfeuchte war es heute morgen richtig kühl. Um 5.30 Uhr waren wir schon beim versprochenen Frühstück, auf das wir dann noch 10 Minuten warten mussten. Der 6-Uhr-Start war nötig, da wir bis La Turba über 1 Stunde zu fahren hatten. Und dort hatten wir Riesenglück, der **Zapata-Zaunkönig** (Zapata Wren) sang nicht nur so schön



wie eine beschwingte Nachtigall – er zeigte sich auch völlig offen. Etliche Ornis bekommen ihn nicht zu Gesicht. Die zeitgleich anwesenden **Rotschulterstärlinge** (Red-shouldered Blackbird) waren da eine Nummer unspektakulärer. Ebenso wie die **Zapata-Ammer** (Zapata Sparrow), die auf wenige Meter Entfernung am Wegrand saßen – Glücksfall Nr. 2. Danach konnten wir entspannt Vögel beobachten: z.B. **Rallenkranich** (Limpkin), **Schneesichler** (White Ibis), **Sumpfschwalbe** (Tree Swallow) und **Rostscheitel-Waldsänger** (Prairie Warbler). Angenehm wenige Mücken gab es in der offenen Sumpflandschaft – aber auch erstaunlich wenige Vögel.

In La Boca, rings um die Krokodilfarm, gab es dafür reichlich Mücken, und auch **Kubakrähe** (Cuban Crow) und **Zwergsultanshuhn** (Purple Gallinule), nicht das erhoffte Blatthühnchen. Zwischen Playa Larga und Playa Giron besuchten wir noch die „Höhle der

Fische“, eine Grotte mit unterirdischem Meerzugang und schönen Korallenfischen (ca. 200 m im Landesinneren) – und vielen wochenendbesuchenden Kubanern.



In der Mittagspause sahen einige Unentwegte einen **Merlin** (Merlin). Der Nachmittag in Bermejas brachte die **Bienenelfe** (Bee Hummingbird) und die erste Eule: Ein **Kubakauz** (Cuban Pygmy-Owl) offen in einem Baum sitzend. Trotz fast zweistündigem Ansitz sahen wir wieder nicht die erhoffte Kubataube (Blue-headed Quail-Dove), aber einige **Gundlach-** und **Bahamatauben**. Dafür ließen wir literweise Blut im Wald. Die Saugquote stieg nochmals an, als wir in der Dämmerung auf die **Kubanachtschwalbe** (Greater Antillean Nightjar) warteten – zum Glück erfolgreich! Der Knüller war dann aber die **Styxeule** (Stygian Owl) in der Hotelanlage abends um 20 Uhr, die Angel gefunden hatte! Saturday Night Fever – das Hotel war voll, viel laute Musik am Abend. Und: Nur noch 22°C, sehr angenehm.

Vögel des Tages (mehrere Mehrfachvoten): Bienenelfe, gefolgt von Styxeule und Zapatazaunkönig, diese gefolgt von Zapataammer, Kubakauz und Kubanachtschwalbe. Heute war der Tag mit den meisten endemischen und sehr seltenen Arten.

So, 14.3.2010

**Vormittag: Zapata/Sopillar und La Picheta, Nachmittag: Zapata/Las Salinas**

Heute Nacht wurde die Zeit eine Stunde vorgestellt. Und da wir unsere Uhren nicht vorgestellt haben, sind wir heute Morgen eine Stunde später aufgestanden als es tatsächlich war. Alles klar?

Es war mit 19°C und 50 % Luftfeuchte sehr angenehm (Maximum des Tages: 27°C). Zuerst fuhren wir nach Sopillar (nahe Playa Larga), wo uns Angel eine **Kubaeule** (Cuban Screech-Owl, Bare-legged Owl) im Höhlenbaum (abgestorbener Palmstamm) präsentierte. Dann fuhren wir weiter nach La Picheta, einem Minidorf mit angrenzender Feuchthfläche, in der etliche Fächerpalmen standen. Hier riefen mehrere **Kubaspechte** (Fernandina's Flicker), die trotz der offenen Landschaft und ihrer Größe erst nach einer Weile zu sehen waren.

Der küstennahe Wald ist ansonsten hier sehr niedrig, vielleicht 7 m hoch. Die Böden sind mager und steinig (aus Korallen), und die Hurrikans rasieren jeden höher wachsenden Baum ab.

Die Mittagspause wurde teils im Meer schnorchelnd (mit vielen tropischen Fischen sehr ufernah), im Pool oder schlafend in der Cabaña verbracht.

Nachmittags (15.30; aber eigentlich ja erst 14.30 Uhr...) ging es auf nach Las Salinas. Eine gute Stunde Fahrt, und wir waren in den Mangroven und Wasserflächen. Dort führt eine aufgeschüttete Piste für viele Kilometer mittendurch, und 2-3 Beobachtungsplattformen standen entlang dieser Stichstraße. Aber es waren recht wenige Vögel zu sehen, und die meisten sehr weit weg. Limikolen: weitgehend Fehlanzeige! Da mussten wir uns schon über einen **Großen Gelbschenkel** (Greater Yellowlegs) freuen! Das war insgesamt recht enttäuschend, weil wir uns hier viel mehr erhofft hatten. Immerhin kletterte die Artenzahl etwas an um Arten wie **Kuba-Krabbenbussard** (Cuban Black-Hawk), **Schwarzmantel-Scherenschnabel** (Black Skimmer), **Rosalöffler** (Roseate Spoonbill), **Königsseeschwalbe** (Royal Tern) und **Nashornpelikan** (American White Pelican).

Sehr überraschend fanden wir nach dem Abendessen neben unseren Cabañas auf einer



Baumspitze eine **Sumpfohreule** (Short-eared Owl) sitzen. Die schnelle Überprüfung ergab, dass die **Styxseule** ebenfalls in ihrem Baum saß, hier also kein Fall von Konvertierung vorlag.

Vögel des Tages: Kubaspecht, Kubaeule und Nashornpelikan (mit Nashorn).

Mo, 15.3.2010

**Vormittag: Zapata/Bermejas, Nachmittag: Zapata/La Enseñada und Bermejas**

Ein nur fast früher Start – weil 4/7 aller Reisetilnehmer gestern zwar ihre Uhren, nicht aber ihre Wecker eine Stunde vorgestellt hatten. Mit dem Vorwurf „Pennbacke“ mussten diese nun leben...

Kurzes Frühstück, und in Bermejas hat uns unser Führer für den heutigen Tag (Orlando) in Empfang genommen. Aber auch ihm gelang es nicht, der abnehmenden Zahl motivierter Reisetilnehmer die Kubataube zu präsentieren. Zuletzt lief 1

Reisetilnehmer mit Reisebegleiter, Tourführer und Orniguide durch den Wald... Die restlichen 6/7 versuchten derweil außerhalb des Waldes die **Bienenelfe** noch einmal zu sehen (gelang kurz). Vogelmäßig also eher etwas zurückhaltend. Immerhin: Mit unter 15°C war es heute früh schön frisch, und die Mücken hielten sich auch sehr zurück. Nach Aussage des Führers ist dies das normale Wetter für die Saison!

Nachmittags fuhren wir weitere ca. 10 km NE von Bermejas entlang der Straße Richtung Santa Clara / Camagüey, zu einer großen Freifläche (La Enseñada), von der aus ein schöner Rundblick möglich war. Gleich flog ein **Schwalbenweih** (Swallow-tailed Kite) vorbei, der leider etwas weit weg war. Aber immerhin, ein Traumvogel! Ein in ca. 3 km Entfernung kreisender **Schlangehalsvogel** (Anhinga) wurde nur von einem Reisetilnehmer gefunden, trotz aller Anstrengungen, ihn auch anderen Reisetilnehmern zu zeigen – zum Glück blieb es nicht der einzige seiner Art. An einem Tümpel ein paar Kilometer zurück saß ein **Rallenkranich** im schönsten Sonnenlicht.

Zurück in Bermejas suchten wir am Spätnachmittag vergeblich den Kuba-Goldspecht, sahen aber dafür brillant in der Nachmittagssonne ein Männchen der **Bienenelfe**.

Nach dem Abendessen saßen an den Cabañas, wie gestern, **Sumpfohreule** und **Styxseule**.

Resümee zu Zapata: Gut, aber sehr enttäuschend die fehlenden Habitate für Wasservögel. Und sehr, sehr schade, dass die Orniguides absolut keinen Plan zu den Rallen haben!

Orlando meint, Februar sei der beste Monat, um die Endemiten zu sehen (womit er auch auf die Kubataube anspielte, die offenbar von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich häufig gesehen wird).

Vogel des Tages: Bienenelfe; Schwalbenweih wegen der Distanz nur auf den Rängen.

Di, 16.3.2010

**Vormittag: Zapata/La Enseñada, tagsüber: Fahrt nach La Belen**

Ein später Start (8.30 Uhr zum Frühstück), wir wollten sowohl uns als auch dem Fahrer etwas mehr Schlaf gönnen. Denn wir hatten die ca. 6 Stunden Fahrzeit zur Sierra Najasa vor uns.

Ein Zwischenstopp an der Freifläche La Enseñada brachte **Kornweihe** (Northern Harrier; anderes Taxon als unsere Kornweihe/Hen Harrier) und **Schneckenweih** (Snail Kite), aber

erst einmal nichts Neues. Orlando haben wir bis zur Autobahn mitgenommen; er unterrichtete heute in einer Schule Umwelt und fährt (trampt) morgen zurück nach Bermejas.

Landschaftlich begleitete uns eine eher weniger interessante Agrarlandschaft, mit viel Zuckerrohr. Erst während der Fahrt dämmerte es dem Reisebegleiter – und bestätigte sich nach dem Studium der Texte in den Bestimmungsbüchern (die Abb. waren weniger hilfreich), dass in La Enseñada ein **Gundlachspërber** (Gundlach's Hawk) über die Gruppe geflogen ist: sehr habichtartig (auch so groß), hell unterseits, mit weißen, auffälligen Unterschwanzdecken; ein Jungvogel. Die Bezeichnung -spërber ist wirklich irreführend!

Hinter Camarguey – es war schon nach 18 Uhr – präsentierten sich einige **Palmenkrähen** (Palm Crow), die zusammen mit zwei Lerchenstärklingen (**Eastern Meadowlark**) auf einem Acker nach Nahrung suchten. Kurz vor Najasa sahen wir noch die ersten **Gelbstirn-Blatthühnchen** (Northern Jacana) der Tour – verblüffend immer wieder die gelbgrünliche Schwingenfärbung im Flug.

Erst in der Dunkelheit waren wir in der sehr schönen Hotelanlage in La Belen. Als faunistisches highlight begrüßte uns eine große Vogelspinne – in der Rezeption! Spätes und leckeres Abendessen, und nur sehr kurze Liste.

Leider werden wir morgen nicht den Orniguide Pedro Regalado bekommen. Der hat illegal einen Parador (kleines Restaurant) betrieben, und deshalb dürfen Staatsfirmen keinen Kontakt zu ihm haben. Ein anderer Orniguide soll morgen früh um 7 Uhr vor Ort sein.

Vogel des Tages: Gundlach“habicht“

Mi, 17.3.2010

**Vormittag: Sendero Interpretativo de las Aves,**  
**Nachmittag: Umgebung Hotel**

In der Nacht hatte sich die Vogelspinne der Rezeption in einen **Kubakauz** verwandelt – ein bizarres Bild, diese Eule auf den Sprossen eines Barhockers in einem kleinen Raum zu sehen.

Der Orniguide kam dann nach 7.30 Uhr – das Auto des Hotelchefs, der ihn abgeholt hatte, war heute morgen kaputt. Es gibt immer einen Grund...

Wir fuhren dann wenige Kilometer zu einem Tor, von dem es noch ca. 500 m zu einem Rundweg („Sendero Interpretativo de las Aves“, 1800 m Länge) waren. Dieser Weg war sehr schön, offene Waldlandschaft, in der man die Vögel sehr



gut beobachten konnte. Neben dem **Kubatyrann** (Giant Kingbird) sahen wir auch einige **Rosenschultertauben** (Plain Pigeon), **Kuba-Amazonen**, **Kubasittiche** und viele **Kubakrähen**. Letztere hatten herrlich modulierte Stimmen und machten viele Luftspiele – sehr unterhaltsame Vögel. Der Höhepunkt war eine große Würgefeige, voll mit vielen Früchten – und sehr vielen Kleinvögeln! Außerhalb ihres normalen Verbreitungsgebietes waren 9 **Türkisnaschvögel** (Red-legged Honeycreeper) zu sehen. Neben den vielen Waldsängern, auch **Tigerwaldsänger** (Cape May Warbler), gab es einen sehr schicken **Baltimoretrupial** (Baltimore Oriole). Die **Indigofinken** (Indigo Bunting) waren leider nur im Übergangskleid. Auf dem Rückweg sahen wir noch einen **Stelzenwaldsänger** (Louisiana Waterthrush) und drei sehr schöne Schmetterlinge.

Es war heiß (28°C), aber nicht zu schwül. Trotzdem kam mittags der Pool sehr recht.

Nachmittags liefen wir noch ein paar km vom Hotel durch die Landschaft. Keine neue

Arten, aber schöne Beobachtungen von **Rallenkranich**, **Blaflügelente** (Blue-winged Teal), **Blatthühnchen** und **Grünreiher** (Green Heron). Kurz nach Sonnenuntergang (nach 19 Uhr) waren wir zurück.

Der Orniguide Camillo war nicht sehr hilfreich bei der Bestimmung der Vögel; er beobachtete selbst erst seit ein paar Monaten Vögel. Immerhin hatte er ein Fernglas. Wenigstens hat er uns an die Stellen zur Beobachtung geführt – ohne allerdings die Würgefeige mit den vielen Kleinvögeln zu beachten. Zum Glück kann man in dieser Landschaft die Vögel selber gut beobachten. Bizarren in der hügeligen Weidelandschaft war eine flüchtende Nilgauantilope – diese Art und etliche Zebras werden gehalten, um eine touristische Attraktion zu bieten... Zeitiges und leckeres Abendessen.

Vögel des Tages: Potpourri aus Kubatyrann, Baltimoretrupial, Indigofink und Tigerwaldsänger.

Do, 18.3.2010

### **Vormittag: Embalse de Najasa, tagsüber: Fahrt nach Cayo Coco**

Ein später Morgen, und alle bedauerten es, die schöne Hotelanlage zu verlassen – zumal wir fast die einzigen Gäste und das Quartier entsprechend ruhig war.

Ein kurzer Stopp am Stausee von Najasa brachte 22 **Schlangenhalsvögel** für alle. ca. 8 **Fischadler** (Osprey), 10 **Gürtelfischer** und diverse Reiher, aber wieder keine Enten.

Bis auf zwei weitere Stopps (Eiscreme, Sandwich) verlief die Fahrt nach Moron eher ereignislos.

Nördlich davon sahen wir an der Laguna La Redonda keinen einen Vogel, und auch die Fahrt entlang der Dammstraße nach Cayo Coco war eher vogelarm, da gerade kein Niedrigwasser war. **Ohrenscharbe** (Double-crested Cormorant) und **Aztekenmöwe** (Laughing Gull) bereicherten die Artenliste.

Unser Orniguide für die nächsten zwei Tage (Paulino) war nicht wie erwartet am Getränkestand am Ende des Damms. Also fuhren wir zum Havanatour-Büro auf Cayo Coco. Während Guillermo dort blieb fuhren wir noch zum Weg zur Höhle (Cueva El Javali). Wir sahen den ersten **Bindenstrandläufer** (Stilt Sandpiper; leider noch komplett schlicht), 2 **Merline** und 2 **Rostscheitel-Waldsänger**, die wir aber erst am Folgetag mit mehr Literatur bestimmen konnten.

Zurück zum Havanatour-Büro eröffnete uns Guillermo, dass es eine Buchungspanne beim Hotel Sol auf Cayo Guillermo gegeben hat. Das Hotel war ausgebucht, und wir mussten im Riesenhotel (> 500 Zimmer) „Cayo Coco Tryp“ unterkommen. Der volle Kulturschock: Riesiger Essensraum, voll, mit unglaublicher Lärmbelastung. Ab 1 m Abstand musste man sich anbrüllen, wenn man sich verständlich machen wollte. Immerhin: Die Zimmer waren weit genug von den Lärmquellen (Animation) entfernt – und „all inclusive“. Letzteres hatte allerdings auch Nachteile, wenn man sich die Horden betrunkenen jugendlicher und weniger jugendlicher Kanadier und Engländer ansah...

Vogel des Tages: allenfalls Schlangenhalsvogel.

Fr, 19.3.2010

### **Vormittag: Leuchtturm Cayo Paredon Grande, Nachmittag: Playa Las Coloradas (eastern part) + Cayo Guillermo**

Frühstück um 7 Uhr, und eine halbe Stunde später liefen wir mit Paulino durch die Hotelanlage. Der ist ein hervorragender Feldornithologe und superguter Birdguide und Naturführer, ausgestattet mit Prismenfernrohr, I-Pod, guten Lautsprechern und einer kleinen Bibliothek naturkundlicher Bücher über Kuba (auch Pflanzen, Schmetterlinge, Säugetiere). Sehr professionell, auch sehr motiviert und bemüht. 5 Sterne!

Noch im Hotelgelände zeigt er uns die eindrucksvollen **Klapperrallen** (Clapper Rail),

**Goldwalsänger** (Yellow Warbler), und den lange vermissten **Kuba-Goldspecht** (Northern Flicker), der im einsetzenden Regen bewegungslos an einem Palmenstamm saß und unter einem Bündel Kokosnüssen Regenschutz hatte, direkt neben dem Swimmingpool.

Dann fuhren wir nach Osten zum Leuchtturm Cayo Paredon Grande, wo wir erst eine halbe Stunde das Ende des Regens im Bus abwarten mussten. 500-1.000 m südlich des Leuchtturms zeigte uns Paulino nacheinander 3 **Kuba-Mückenfänger** (Cuban Gnatcatcher), mehrere **Fornswaldsänger** (Oriente Warbler) und einen etwas feuchten **Dickschnabelvireo** (Thick-billed Vireo) – alle dort „wichtigen“ Vogelarten. Es wurde wieder sonnig und warm.

Nach der Mittagspause fuhren wir erst zu einem relativ nahe gelegenen Strand, um den seltenen **Gelbfuß-Regenpfeifer** (Piping Plover) zu sehen, neben einigen anderen Limis, z.B. einigen **Kurzschnabel-Schlammläufern** (Short-billed Dowitcher) und etlichen **Amerika-Sandregenpfeifern** (Semipalmated Plover). Zügig ging es weiter die ca. 40 km nach Cayo Guillermo, wo wir ein paar km westlich der Hotels (erste Kakteen) gleich als hauptsächliche Zielart die **Gundlach-Spottdrossel** (Bahama Mockingbird) fanden, sehr kooperativ auf einem Busch sitzend und singend. Ein highlight war dann an der Hauptstraße zurück eine Feuchthfläche mit vielen Limis, die in schönem Licht hervorragend zu studieren waren (u.a. alle 3 „peeps“: **Sand-**, **Wiesen-** und **Bergstrandläufer** (Semipalmated, Least und Western Sandpiper). Viel weniger Mücken als auf Cayo Coco; dort wurden die Hotels mindestens 1x am Tag mit Qualmkanonen behandelt (wie z.B. auch in den Hotelanlagen an der ägyptischen Rotmeerküste).

Schöne Abendstimmung am Watt östlich von Cayo Guillermo, mit **Delawarenmöwe** (Ring-billed Gull), **Krabbenreiher** (Yellow-crowned Night-Heron) und einem **weißen Kanadareiher** (Great Blue Heron, white morph).

Heute weniger Lärm (viele Touris abgereist), und wieder hervorragendes Abendbuffet.

Vogel des Tages: Kuba-Mückenfänger (vor Krabbenreiher).

Sa, 20.3.2010

### **Morgen: Hotel Tryp Cayo Coco, Vormittag: Cueva El Javalí, Nachmittag: Playa Las Coloradas**

Noch vor dem Frühstück zeigte uns Paulino im Hotelgelände die **Kubapfeifgans** (West Indian Whistling-Duck), und wir sahen eine superschicke **Weißscheiteltaube** (White-crowned Pigeon) formatfüllend durch das Prismenfernrohr (um hier nicht die doppelte Falschaussage eines Reisetelnehmers zu wiederholen, dass der Vogel „in seinem



*Spektiv“ sei...).*

Nach dem Frühstück fuhren nur noch 3/7 der Reisetelnehmer zur Gueva El Javalí und wurden für das Mückenfüttern mit einem (leider nur weiblichen) **Papstfinken** (Painted Bunting), einer **Bahamataube**, vielen **Streifenkopftangaren** und **Gimpelfinken** (Cuban Bullfinch) sowie den letzten **Vielfarbtodis** der Reise belohnt – die endemische Unterart der Zapata-Ammer blieb aber verborgen.

Die lange Mittagspause nutzte ein Teilnehmer zum Schnorcheln, und um 16.30 Uhr fuhren wir noch einmal zum Strand von Las Coloradas, wo neben dem

jetzt sehr nahen **Gelbfuß-Regenpfeifern** auch 4 stoßtauchende **Braunpelikane** zu sehen waren. Dicht vorbei flog ein **Fischadler** der lokalen hellköpfigen Unterart *ridgwayi*. Alles leider bei bedecktem Himmel und sehr starkem Wind.

Der proppenvolle Essenssaal mit lauten, angetrunkenen Engländern versüßte uns etwas die an sich bedauernswerte Erkenntnis, dass wir morgen dieses Hotel und leider auch das Land verlassen...

Vogel des Tages: Weißscheiteltaube; auf den Plätzen Kubapfeifgans und Gelbfuß-Regenpfeifer.


So, 21.3.2010

### **Fahrt Cayo Coco – Habana, kurze Stadtbesichtigung, Heimflug**

Heute war es schwül und wolkig. Wir starteten um 8.30 Uhr die lange Fahrt nach Habana – nicht ohne vorher noch das Gruppenfoto gemacht zu haben. Allerdings war 1/7 der Reiseteilnehmer schon abgereist, um noch eine Woche Urlaub auf Cayo Guillermo zu verbringen.

Habana erreichten wir nach zügiger Fahrt mit 1-2 Pausen gegen 16 Uhr. Die zweistündige Stadtführung brachte uns von der Plaza de Armas über die Plaza de San Francisco und die Plaza Vieja zur Plaza de la Catedral. Die Sonne schien und es war schwülwarm. Nach einem etwas eiligen Abendessen wurden 2 Reiseteilnehmer in einem Hotel in Habana abgesetzt, das sie schon von Deutschland aus gebucht hatten; ihr Flug ging 24 Stunden später. Pünktlich um 20 Uhr waren die restlichen 4/7 mit dem Reisebegleiter am Flughafen ... um zu erfahren, dass der Flug nicht von 0.15 Uhr auf 23.15 Uhr vorgezogen, sondern auf 1.15 Uhr nach hinten verschoben wurde – entgegen der Auskunft von Iberia in Berlin und Havanatour (allerdings von einem Reiseteilnehmer so prognostiziert, was der Reisebegleiter bedauernswerterweise nicht glauben wollte)! Das bedeutete 5 statt 3 Stunden Wartezeit am Flughafen...

Der Reisebegleiter fuhr nach dem Einchecken der vier Teilnehmer mit dem Taxi zurück in die Stadt, um sich noch ein paar Tage Habana anzusehen. Dies brachte neben vielfältigsten und interessanten Eindrücken als zusätzliche Arten **Wanderfalke** (Peregrine), **Amerika-Silbermöwe** (American Herring Gull), **Brandseeschwalbe** (Sandwich Tern) und **Seiden-Kuhstärling** (Shiny Cowbird).



## **Ein paar persönliche Anmerkungen des Reisebegleiters:**

### **- zum Land**

Das Land ist so widersprüchlich wie erwartet, wenn auch etwas anders... Die Atmosphäre war sehr entspannt und locker, ganz anders als in den anderen ehemals „sozialistischen“ Ländern – karibisch eben. Die Polizei trat kaum in Erscheinung, die wenigen Kontrollen waren sehr lax. In der Hauptstadt achtete sie allerdings sehr darauf, dass Touristen nicht belästigt wurden.

Auf der Pro-Seite steht eine recht soziale Einstellung der Bevölkerung untereinander, sehr geringe Kriminalität, gute Bildung, hervorragende (kostenlose) Gesundheitsversorgung und kein erkennbares Dahinvegetieren der untersten Gesellschaftsschicht (wie in so vielen anderen tropischen/subtropischen Ländern). Es ist eines der wenigen Länder ohne US-amerikanische Fast-Food-Ketten.

Auf der Contra-Seite stehen unter anderem die für > 95 % der Bevölkerung nicht existierende Reisefreiheit (die allerdings aufgrund fehlenden Geldes ohnehin kaum jemand nutzen könnte), das fast nicht existierende öffentliche Verkehrssystem (mit Wartezeiten auf völlig überfüllte Busse von mehreren Stunden), und die sehr dürftige Versorgung des größten Teils der Bevölkerung, die sich in den letzten Jahren nach vielen Aussagen erheblich verschlechtert hat. Derzeit gibt es z.B. kein Salz, Reis und keine Seife. Die langen Schlangen vor den Geschäften mit Ausgabe der rationierten Lebensmittel sind unübersehbar. Die Rationen sind z.T. lächerlich klein, z.B. 8 Eier pro Erwachsenen und Monat.

Ferner habe ich den Eindruck, dass die Einführung des disponiblen Peso (CUC) zu wachsenden Problemen führt. Zwar ist es vom Ansatz her nicht ganz ungerecht, wenn z.B. ein Tourist fürs Klo 0,20 CUC zahlt, und damit 24x so viel wie ein Einheimischer, der 0,20 nationale Pesos dafür lohnen muss – aber die Bevölkerung wird dadurch gespalten. Denn nur noch wenige Dinge sind überhaupt für nationale Pesos kaufbar. Die große Masse lebt auf unterstem Niveau von rationierten Lebensmitteln, und die über den Tourismus an CUC oder Euros kommenden Menschen können sich alles Mögliche leisten, denn zu Kaufen gibt es fast Alles, aber eben zu Weltmarktpreisen und nur für CUC. Wie lange das noch gut geht?!

### **- zur Gruppe**

Mit 7 Reiset Teilnehmern war es eine angenehm kleine Gruppe. Spannungen gibt es immer, wenn verschiedene erwachsene Persönlichkeiten zusammen kommen, aber grundsätzlich habe ich die Tour als ausreichend harmonisch erlebt. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass unvermeidbare Änderungen des Reiseverlaufs (z.B. Hotelumbuchungen, s.u.) zwar kritisiert, aber nicht als so ausgemachte Katastrophe beklagt würden. Oft macht man sich das Leben leichter, wenn man seine Energie dazu verwendet, das Beste aus der Situation zu machen. Trotzdem wurde sehr viel mit Humor genommen und wir hatten auch viel zu Lachen.

Es scheint doch in der deutschen Mentalität zu liegen, dass Abweichungen vom Plan als grundsätzlich schlimm empfunden werden – auch wenn sie es nicht immer sein müssen. Sehr positiv war, dass Kritik gleich geäußert wurde – das lies etwas „Luft“ heraus und gab mir das Gefühl zu wissen, woran ich bin. In einem Fall wurde allerdings sehr herbe Kritik erst nach der Fahrt geäußert; nach meiner Meinung keine sehr hilfreiche Vorgehensweise. Im Gelände war die Gruppe sehr diszipliniert, und im Wald wurde wirklich nur geflüstert – große Klasse. Ich würde mich über die Teilnehmer auf weiteren Reisen sehr freuen.

### **- zum Reiseverlauf**

Temperaturmäßig (warm bis heiß, zeitweise schwül) hat das Land voll meine Erwartungen erfüllt, zumal selbst das Hügelland sehr niedrig liegt. Frappierend fand ich die vielen Stechmücken im Wald bei Zapata und auf Cayo Coco – in der Trockenzeit kenne ich die Tropen anders. Vogelmäßig hätte ich viel mehr Feuchtgebietsvögel (Enten, Limikolen) erwartet, aber die Habitate gaben nicht viel mehr her. Dafür haben wir bis auf die Kubataube (trotz 3 halber Tage hierfür!) alle machbaren Endemiten gesehen (siehe Tabelle im Anhang), meist dank der guten lokalen Führer.

Pannen gab es reichlich auf der Tour, die aber letztlich den ornithologischen Erfolg kaum

geschmälert haben dürften:

- Ich kam aufgrund einer Verspätung des Iberiafluges von Madrid nach Berlin erst in Madrid an, als der Flug nach Habana schon startete. Damit fehlte ich bei der Ankunft am ersten Tag.
- Der kubanische Reiseleiter, der jahrelang die Touren begleitete, weilte in Kanada, und sein Kollege konnte ihn nicht wirklich ersetzen. Nicht nur, dass er die Beobachtungsgebiete unterwegs nicht kannte (über die ich auch nur durch ± vage Literaturangaben Kenntnis hatte); er hatte auch öfters nicht so richtig „einen Plan“ und sein Deutsch war für viele Reiseteilnehmer nicht so richtig verständlich. Dafür war sein Englisch hervorragend, und mit meinen rudimentären Spanischkenntnissen konnte notfalls 3sprachig jedes Thema erörtert werden. Allerdings verschlechterte sich die Stimmung zwischen ihm und der Gruppe zusehends (gegenseitig), was ich nicht wirklich auffangen konnte. Im Gelände verhielt er sich meist umsichtig und wartete z.B. an Wegekrenzungen auf die letzten Reiseteilnehmer. Für uns nur teilweise erkennbar waren allerdings die schwierigen Arbeitsbedingungen für ihn: So gab es kein Diensthandy, er musste viel Gespräche selber bezahlen, und sein Chef war grundsätzlich nicht erreichbar, wenn eine Entscheidung getroffen werden musste. Nach meinem Eindruck wurden ihm von der Gruppe zu viele Fehler angekreidet.
- Das Hotel der 2. und 3. Nacht war umgebucht von „Los Jazmines Viñales“ in „Rancho San Vincente“, ein paar km weiter. Vogelkundlich zwar vermutlich ein Gewinn, aber die Reiseteilnehmer waren 2 Tage nicht über die angegebenen Telefonnummern erreichbar.
- Das Hotel der 4. – 7. Nacht war umgebucht, von „Hotel Villa Playa Larga“ auf „Hotel Playa Giron“, 34 km weiter. Vogelkundlich zwar ebenfalls kein Nachteil (Styx- und Sumpfohreule im Gelände), und das Hauptgebiet Bermejas war nur 14 km entfernt, aber die Gruppe war weitere 4 Tage nicht über die angegebenen Telefonnummern erreichbar. Dafür gab es den Bonus der Vollverpflegung und die Lage war ruhiger als Playa Larga. Meiner Meinung nach sollte das Hotel für künftige Touren beibehalten werden.
- In der Sierra Najasa stand der erfahrene Orniguide Pedro Regalado Ruiz für staatlich organisierte Touren nicht zur Verfügung, so dass uns ein unerfahrener Guide führte. Die wichtigen Vogelarten waren aber recht einfach zu sehen.
- Offenbar durch Schlampigkeit (oder Prioritätensetzung zugunsten einer größeren Reisegruppe) beim „Hotel Sol Cayo Guillermo“ kamen wir auch dort nicht mehr unter und mussten zum „Hotel Tryp Cayo Coco“ wechseln. Vogelkundlich war dies vermutlich wieder ein Gewinn (Kuba-Goldspecht, Kubapfeifgans, Klapperralle, Goldwaldsänger und Weißscheiteltaube direkt auf dem Gelände; zentrale Lage zwischen Cayo Guillermo mit Gundlach-Spottdrossel und Cayo Paredon Grande mit Dickschnabelvireo und Kuba-Mückenfänger), aber aufgrund des wirklich unglaublich hohen Lärmpegels bei allen Mahlzeiten waren alle Reiseteilnehmer anschließend wirklich erholungsreif! Das Quartier ist einfach zu riesig! Vermutlich wäre ein kleineres Hotel auf Cayo Coco die beste Wahl.

Grundsätzlich war die Tour aber hervorragend durchorganisiert und durchgestylt – stressfrei wurden alle wichtigen Gebiete besucht, außer an den Reisetagen konnte immer eine Mittagspause im Hotel genossen werden, und die Führer vor Ort waren (mit 1 1/2 Ausnahmen) prima. Und tatsächlich war es ja vogelkundlich eine tolle Reise! Ich bedanke mich ganz herzlich für die schöne Reise, das Trinkgeld und wünsche Euch Allen das Beste!!

Klemens Steiof  
Fotos: Klemens Steiof

## Anhang: Tabelle Endemiten

### KUBA-ENDEMITEN

#### gesehene Arten

- |                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Gundlachhabicht (Gundlach's Hawk)                      | 16. Kubamückenfänger (Cuban Gnatcatcher)                  |
| 2. Kubasittich (Cuban Parakeet)                           | 17. Kubaklarino (Cuban Solitaire)                         |
| 3. Kubaspecht (Fernandina's Flicker)                      | 18. Gundlachvireo (Cuban Vireo)                           |
| 4. Kubaeule (Cuban Screech-Owl)                           | 19. Fornswaldsänger (Oriente Warbler)                     |
| 5. Kubakauz (Cuban Pygmy-Owl)                             | 20. Gelbkopf-Waldsänger (Yellow-headed Warbler)           |
| 6. Kubanachtschwalbe (Cuban 'Greater Antillean' Nightjar) | 21. Kuba-Antillentrupial (Cuban Greater Antillean Oriole) |
| 7. Bienenelfe (Bee Hummingbird)                           | 22. Kubastärling (Cuban Blackbird)                        |
| 8. Vielfarbertody (Cuban Tody)                            | 23. Rotschulterstärling (Red-shouldered Blackbird)        |
| 9. Kubatrogon (Cuban Trogon)                              | 24. Kubafink (Cuban Grassquit)                            |
| 10. Blutfleckspecht (Cuban Green Woodpecker)              | 25. Zapata-Ammer (Zapata Sparrow)                         |
| 11. Kuba-Goldspecht (Cuban 'Northern' Flicker)            |                                                           |
| 12. Kubatyrann (Giant Kingbird)                           |                                                           |
| 13. Palmenkrähe (Cuban Palm Crow)                         |                                                           |
| 14. Kubaschwalbe (Cuban Martin)                           |                                                           |
| 15. Kubazaunkönig (Zapata Wren)                           |                                                           |

#### nicht gesehene Arten

1. Zapataralle (Zapata Rail)<sup>1</sup>
2. Kuba-Langschnabelweihe (Cuban Kite)<sup>2</sup>
3. Kubataube (Blue-headed Quail-Dove)<sup>3</sup>

### ENDEMITEN DER WEST-INDISCHEN INSELN, DIE AUF KUBA VORKOMMEN

#### gesehene Arten

- |                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Kuba-Pfeifgans (West Indian Whistling-Duck) | 14. Kubakrähe (Cuban Crow)                                           |
| 2. Rosenschultertaube (Plain Pigeon)           | 15. Gundlach-Spottdrossel (Bahama Mockingbird)                       |
| 3. Antillentaube (Scaly-naped Pigeon)          | 16. Rotfußdrossel (Red-legged Thrush)                                |
| 4. Bahamataube (Key West Quail-Dove)           | 17. Kubawaldsänger (Olive-capped Warbler)                            |
| 5. Gundlachtaube (Grey-headed Quail-Dove)      | 18. Kuba-Streifenkopftangare (Cuban 'Western' Stripe-headed Tanager) |
| 6. Kuba-Amazone (Rose-throated Parrot)         | 19. Antillengrackle (Greater Antillean Grackle)                      |
| 7. Eidechsenkuckuck (Great Lizard-Cuckoo)      | 20. Braunschulterstärling (Tawny-shouldered Blackbird)               |
| 8. Kubasegler (Antillean Palm Swift)           | 21. Schwarzgimpelfink (Cuban Bullfinch)                              |
| 9. Ricord-Kolibri (Cuban Emerald)              |                                                                      |
| 10. Bahamaspecht (West Indian Woodpecker)      |                                                                      |
| 11. Sagratyrann (La Sagra's Flycatcher)        |                                                                      |
| 12. Bahamatyrann (Loggerhead Kingbird)         |                                                                      |
| 13. Braunbauchtyrann (Crescent-eyed Pewee)     |                                                                      |

#### nicht gesehene Arten

1. Antillennachtschwalbe (Antillean Nighthawk)<sup>4</sup>
2. Bahamaschwalbe (Bahama Swallow)<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Zapataralle ist offenbar sehr selten und quasi „unsehbar“ im Sumpfgebiet von Zapata.

<sup>2</sup> Kuba-Langschnabelweihe ist extrem seltener Brutvogel im Osten des Landes (Guantanamo), und bei nur 3 Beobachtungen in den letzten 3 Jahrzehnten des 20. Jhdts. möglicherweise schon ausgestorben.

<sup>3</sup> Kubataube kann wohl am besten in La Güira und Zapata gesehen werden; wir hatten es 3 halbe Tage in Zapata versucht – vergeblich. Unsere einzige „vermisste“ endemische Art!

<sup>4</sup> Antillennachtschwalbe kommt erst im April an, ist dann allerdings gebietsweise häufig.

<sup>5</sup> Bahamaschwalbe ist seltener Wintergast in Ost-Kuba – war also nicht wirklich drin auf unserer Tour.

|                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X = bis 10 Exmpl. vorhanden (mehrere Beob.)<br>XX = bis 100 Exmpl.<br>XXX = bis 1.000 Exmpl.<br>XXXX = über 1.000 Exmpl.<br>Zahl = Anzahl der Art | (X) = Käfigvögel<br>>/< = mehr als / weniger als<br>~ = ungefähr<br>? = nicht sicher bestimmt<br>ruf = rufend | T = tot gefunden<br>G = Gelege<br>M/W = Männchen/Weibchen<br>Kol. = Brutkolonie<br>BP = brütende Paare |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      | Fl.      | West Kuba |          |          |          | Zapata   |          |          | Sierra Najasa |          |          | Caya Coco |          |          | Fl.      |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|                                                      | 08.03.10 | 09.03.10  | 10.03.10 | 11.03.10 | 12.03.10 | 13.03.10 | 14.03.10 | 15.03.10 | 16.03.10      | 17.03.10 | 18.03.10 | 19.03.10  | 20.03.10 | 21.03.10 | 22.03.10 |
| <b>Kuba</b>                                          |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <b>GALLIFORMES: Numididae</b>                        |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Helmpferlhuhn (Helmeted Guineafowl)                  |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Numida meleagris</i>                              |          |           |          |          |          |          |          |          | ~30           | ~30      | ~60      | ~20       |          |          |          |
| <b>GALLIFORMES: Odontophoridae</b>                   |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Virginianwachtel (Northern Bobwhite)                 |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Colinus virginianus</i>                           |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <b>ANSERIFORMES: Dendrocygnidae</b>                  |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Gelbbrust-Pfeifgans (Fulvous Whistling-Duck)         |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Dendrocygna bicolor</i>                           |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Kubapfeifgans (West Indian Whistling-Duck)           |          | 1.        | 1.       |          |          |          |          |          |               |          |          |           | 2        |          |          |
| <i>Dendrocygna arborea</i>                           |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Rotschnabel-Pfeifgans (Black-bellied Whistling-Duck) |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Dendrocygna autumnalis</i>                        |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <b>ANSERIFORMES: Anatidae</b>                        |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Maskenente (Masked Duck)                             |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Nomonyx dominica</i>                              |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Schwarzkopf-Ruderente (Ruddy Duck)                   |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Oxyura jamaicensis</i>                            |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Moschusente (Muscovy Duck)                           |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Cairina moschata</i>                              |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Brautente (Wood Duck)                                |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Aix sponsa</i>                                    |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Amerikanische Pfeifente (American Wigeon)            |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Anas americana</i>                                |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Stockente (Mallard)                                  |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Anas platyrhynchos</i>                            |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Blaufügelente (Blue-winged Teal)                     |          | 2.        | 2.       |          |          |          | 6        | ~20      |               | ~15      |          | 1         |          |          |          |
| <i>Anas discors</i>                                  |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Löffelente (Northern Shoveler)                       |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Anas clypeata</i>                                 |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Bahamaente (White-cheeked Pintail)                   |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Anas bahamensis</i>                               |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Spießente (Northern Pintail)                         |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Anas acuta</i>                                    |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Krickente (Common Teal)                              |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Anas crecca</i>                                   |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Ringschnabelente (Ring-necked Duck)                  |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Aythya collaris</i>                               |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Bergente (Greater Scaup)                             |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Aythya marila</i>                                 |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Veilchenente (Lesser Scaup)                          |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Aythya affinis</i>                                |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Mittelsäger (Red-breasted Merganser)                 |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <i>Mergus serrator</i>                               |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| <b>PICIFORMES: Picidae</b>                           |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Bahamaspecht (West Indian Woodpecker)                |          | 3.        | 3.       | 4        | 4        | 2        | 2        | 4        | ~5            | 3        |          | ~15       | 4        |          | 1        |
| <i>Melanerpes superciliosus</i>                      |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Feuerkopf-Saftlecker (Yellow-bellied Sapsucker)      |          | 4.        | 4.       | 1        |          |          | 1M       | 1M       |               | 1        |          | 1         |          |          | 1        |
| <i>Sphyrapicus varius</i>                            |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Blutfleckspecht (Cuban Green Woodpecker)             |          | 5.        |          | 2        | 1        |          | 1        | 2+1      |               | 1        |          | 2         |          |          | 1        |
| <i>Xiphidiopicus percussus</i>                       |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Goldspecht (Northern Flicker)                        |          | 6.        |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           | 1        |          |          |
| <i>Colaptes auratus</i>                              |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |
| Kubaspecht (Fernandina's Flicker)                    |          | 7.        |          |          |          |          |          |          | ~3            |          |          |           |          |          |          |
| <i>Colaptes fernandinae</i>                          |          |           |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |          |

|                                                                                  | Fl.      | West Kuba |          |          |                                    | Zapata              |          |          |           | Sierra Najasa    |                     |          | Caya Coco |          |          | Fl. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|------------------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|-----|
|                                                                                  | 08.03.10 | 09.03.10  | 10.03.10 | 11.03.10 | 12.03.10                           | 13.03.10            | 14.03.10 | 15.03.10 | 16.03.10  | 17.03.10         | 18.03.10            | 19.03.10 | 20.03.10  | 21.03.10 | 22.03.10 |     |
| <b>Kuba</b>                                                                      |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| <b>TROGONIFORMES: Trogonidae</b>                                                 |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Kubatrogon (Cuban Trogon)<br><i>Priotelus temnurus</i>                           | 8.       |           | 6        |          | ~5                                 | 2                   | ~5       | >10      |           | ~10              |                     |          |           |          |          |     |
| <b>CORACIIFORMES: Todidae</b>                                                    |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Vielfarbtoddi (Cuban Tody)<br><i>Todus multicolor</i>                            | 9.       |           | 2        | 3        |                                    | >5                  | 2        | 1,1      | >5        |                  |                     |          | 1         |          |          |     |
| <b>CORACIIFORMES: Cerylidae</b>                                                  |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Gürtelfischer (Belted Kingfisher)<br><i>Megaceryle alcyon</i>                    | 10.      |           | 1,1      |          | 1                                  | 1                   | ~10      | 1        |           |                  | ~12                 | 1        | 2         |          |          |     |
| <b>CUCULIFORMES: Coccozyidae</b>                                                 |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Schwarzschnabelkuckuck (Black-billed Cuckoo)<br><i>Coccyzus erythrophthalmus</i> |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Gelbschnabelkuckuck (Yellow-billed Cuckoo)<br><i>Coccyzus americanus</i>         |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Mangrovekuckuck (Mangrove Cuckoo)<br><i>Coccyzus minor</i>                       |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Eidechsenkuckuck (Great Lizard-Cuckoo)<br><i>Saurothera merlini</i>              | 11.      |           | 1        |          | 1 <sup>+</sup><br>3 <sup>ruf</sup> | ~5                  | 3        | >10      | 1         | 1                | 1                   |          |           |          |          |     |
| <b>CUCULIFORMES: Crotophagidae</b>                                               |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Glattschnabelani (Smooth-billed Ani)<br><i>Crotophaga ani</i>                    | 12.      |           | 12       | 6        | >20                                | 2                   |          | 20       | >30       | ~20              | >30                 | >20      |           |          |          |     |
| <b>PSITTACIFORMES: Psittacidae</b>                                               |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Kubasittich (Cuban Parakeet)<br><i>Aratinga euops</i>                            | 13.      |           |          |          |                                    | 6                   | ruf      |          | 11        |                  | ~30                 |          |           |          |          |     |
| Kubaamazone (Cuban Parrot)<br><i>Amazona leucocephala</i>                        | 14.      |           |          |          |                                    | 2 <sup>+</sup><br>4 | 2        | 2        | 2         |                  | 5 <sup>x</sup><br>2 |          |           |          |          |     |
| <b>APODIFORMES: Apodidae</b>                                                     |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Schwarzsegler (Black Swift)<br><i>Cypseloides niger</i>                          |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Halsbandsegler (White-collared Swift)<br><i>Streptoprocne zonaris</i>            |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Schornsteinsegler (Chimney Swift)<br><i>Chaetura pelagica</i>                    |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Kubasegler (Antillean Palm-Swift)<br><i>Tachornis phoenicobia</i>                | 15.      |           | >50      | 4        | 2                                  |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          | 2        |     |
| <b>TROCHILIFORMES: Trochilidae</b>                                               |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Ricord-Kolibri (Cuban Emerald)<br><i>Chlorostilbon ricordii</i>                  | 16.      |           | ~10      | ~7       | 1                                  | >20                 | ~5       | 1        | 6         |                  |                     | 1        | 1,1       | ~5       |          |     |
| Rubinkehlkolibri (Ruby-throated Hummingbird)<br><i>Archilochus colubris</i>      |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Bienenelfe (Bee Hummingbird)<br><i>Mellisuga helenae</i>                         | 17.      |           |          |          |                                    |                     | 1M.      | 1M.      |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| <b>STRIGIFORMES: Tytonidae</b>                                                   |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Schleihereule (Barn Owl)<br><i>Tyto alba</i>                                     | 18.      |           | 1        |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| <b>STRIGIFORMES: Strigidae</b>                                                   |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Kubaeule (Bare-legged Owl)<br><i>Otus lawrencii</i>                              | 19.      |           |          |          |                                    |                     | 1        |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Kubakauz (Cuban Pygmy-Owl)<br><i>Glaucidium siju</i>                             | 20.      |           |          |          |                                    |                     | 1        | 1        | >5<br>ruf | 1 <sup>ruf</sup> | 2                   |          |           |          |          |     |
| Kaninchenkauz (Burrowing Owl)<br><i>Speotyto cunicularia</i>                     |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Styxseule (Stygian Owl)<br><i>Asio stygius</i>                                   | 21.      |           |          |          |                                    |                     | 1        | 1        | 1         |                  |                     |          |           |          |          |     |
| Sumpfhohreule (Short-eared Owl)<br><i>Asio flammeus</i>                          | 22.      |           |          |          |                                    |                     |          | 1        | 1         |                  |                     |          |           |          |          |     |
|                                                                                  |          |           |          |          |                                    |                     |          |          |           |                  |                     |          |           |          |          |     |

|                                                                                 | Fl.      | West Kuba |          |          |              | Zapata       |          |          |          | Sierra Najasa |          |          | Caya Coco |          |          | Fl. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----|
|                                                                                 | 08.03.10 | 09.03.10  | 10.03.10 | 11.03.10 | 12.03.10     | 13.03.10     | 14.03.10 | 15.03.10 | 16.03.10 | 17.03.10      | 18.03.10 | 19.03.10 | 20.03.10  | 21.03.10 | 22.03.10 |     |
| <b>Kuba</b>                                                                     |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <b>STRIGIFORMES: Caprimulgidae</b>                                              |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Falkennachtschwalbe (Common Nighthawk)<br><i>Chordeiles minor</i>               |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Antillennachtschwalbe (Antillean Nighthawk)<br><i>Chordeiles gundlachi</i>      |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Carolinanachtschwalbe (Chuck-will's-widow)<br><i>Caprimulgus carolinensis</i>   |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Kubanachtschwalbe (Greater Antillean Nightjar)<br><i>Caprimulgus cubanensis</i> | 23.      |           |          |          |              | 1            |          |          |          |               |          | 1        |           |          |          |     |
| <b>COLUMBIFORMES: Columbidae</b>                                                |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Felsentaube (Rock Pigeon)<br><i>Columba livia domestica</i> Straßentaube        |          | x         | x        | x        | x            | x            | x        | x        | x        | x             | x        | x        | x         | x        | x        |     |
| Weißscheiteltaube (White-crowned Pigeon)<br><i>Columba leucocephala</i>         | 24.      |           |          |          |              |              | 1        | 1        |          |               |          | 1 auf 1  | 1         | 1        |          |     |
| Antillentaube (Scaly-naped Pigeon)<br><i>Columba squamosa</i>                   | 25.      |           |          | 1+3      |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Rosenschultertaube (Plain Pigeon)<br><i>Columba inornata</i>                    | 26.      |           |          |          |              |              |          |          |          | ~6            |          |          |           |          |          |     |
| Turteltaube (European Turtle-Dove)<br><i>Streptopelia turtur</i>                |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Türkentaube (Eurasian Collared-Dove)<br><i>Streptopelia decaocto</i>            | 27.      |           |          | ~5       |              |              |          |          |          |               |          | 2        | 4         |          |          |     |
| Carolinataube (Mourning Dove)<br><i>Zenaida macroura</i>                        | 28.      | >10       | 1        | >50      | ~10          | ~15          | >30      | >500     | ~10      |               |          |          |           |          |          |     |
| Liebestaube (Zenaida Dove)<br><i>Zenaida aurita</i>                             | 29.      |           |          |          | 6            | 4            | 2        | 6        |          |               | 1        |          | 1         |          |          |     |
| Weißflügeltaube (White-winged Dove)<br><i>Zenaida asiatica</i>                  | 30.      |           | 1        | 1        |              |              | 2        | 1        |          | ~15           | 1        | 3        | 2         |          |          |     |
| Sperlingstäubchen (Common Ground-Dove)<br><i>Columbina passerina</i>            | 31.      |           | 3        | 2+4      |              |              | 2        |          |          | ~10           | ~20      | ~10      | ~10       |          |          |     |
| Gundlach-Taube (Grey-headed Quail-Dove)<br><i>Geotrygon caniceps</i>            | 32.      |           |          |          | 2 imm + 5 ad | 3            | 1        |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Bahamataube (Key West Quail-Dove)<br><i>Geotrygon chrysis</i>                   | 33.      |           |          |          | 2            | 2            |          | 2        |          |               |          |          | 1         |          |          |     |
| Bergtaube (Ruddy Quail-Dove)<br><i>Geotrygon montana</i>                        |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Kubataube (Blue-headed Quail-Dove)<br><i>Stanoenas cyanocephala</i>             |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <b>GRUIFORMES: Gruidae</b>                                                      |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Kanadakraich (Sandhill Crane)<br><i>Grus canadensis</i>                         |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <b>GRUIFORMES: Aramidae</b>                                                     |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Rallenkraich (Limpkin)<br><i>Aramus guarauna</i>                                | 34.      |           |          |          |              | 1            |          | 1        | 1 auf ~7 | 1             |          |          |           |          |          |     |
| <b>GRUIFORMES: Rallidae</b>                                                     |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Schieferralle (Black Rail)<br><i>Laterallus jamaicensis</i>                     |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Klapperralle (Clapper Rail)<br><i>Rallus longirostris</i>                       | 35.      |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          | 3        | 1         |          |          |     |
| Königsralle (King Rail)<br><i>Rallus elegans</i>                                |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Carolinasumpfhuhn (Sora)<br><i>Porzana carolina</i>                             |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Gelbb Brust-Sumpfhuhn (Yellow-breasted Crake)<br><i>Porzana flaviventer</i>     |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Kubaralle (Zapata Rail)<br><i>Cyanolimnas cerverai</i>                          |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Pardelralle (Spotted Rail)<br><i>Pardirallus maculatus</i>                      |          |           |          |          |              |              |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Zwergsultanshuhn (Purple Gallinule)<br><i>Porphyrio martinicus</i>              | 36.      |           |          |          |              | 2 ad + 1 imm |          |          |          | 1 ad 1 imm    |          |          |           |          |          |     |
| Teichhuhn (Common Moorhen)<br><i>Gallinula chloropus</i>                        | 37.      |           |          |          |              |              |          |          |          | 2             | >20      |          |           |          |          |     |

|                                                     | Fl.      | West Kuba |          |          |          | Zapata   |          |          |          | Sierra Najasa |          |          | Caya Coco |          |          | Fl. |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----|
|                                                     | 08.03.10 | 09.03.10  | 10.03.10 | 11.03.10 | 12.03.10 | 13.03.10 | 14.03.10 | 15.03.10 | 16.03.10 | 17.03.10      | 18.03.10 | 19.03.10 | 20.03.10  | 21.03.10 | 22.03.10 |     |
| <b>Kuba</b>                                         |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Indianerbläuhuhn (American Coot)                    |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Fulica americana</i>                             | 38.      |           |          | 1        | 50       |          |          |          |          | 1             |          |          |           |          |          |     |
| Karibenbläuhuhn (Caribbean Coot)                    |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Fulica caribaea</i>                              |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <b>CICONIIFORMES: Scolopacidae</b>                  |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Wilson-Bekassine (Wilson's Snipe)                   |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Gallinago delicata</i>                           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Regenbrachvogel (Whimbrel)                          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Numenius phaeopus</i>                            | 39.      |           |          |          |          |          | 1        | ruf      |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Prärieläufer (Upland Sandpiper)                     |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Bartramia longicauda</i>                         |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Großer Gelbschenkel (Greater Yellowlegs)            |          |           |          |          |          |          | 1        |          |          |               | 1        | 1        |           |          |          |     |
| <i>Tringa melanoleuca</i>                           | 40.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Gelbschenkel (Lesser Yellowlegs) kleiner            |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Tringa flavipes</i>                              | 41.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               | 1        | 3        |           |          |          |     |
| Einsiedel-Wasserläufer (Solitary Sandpiper)         |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Tringa solitaria</i>                             | 42.      |           |          |          |          | 1        |          |          |          | 1             |          |          |           |          |          |     |
| Drosselufeläufer (Spotted Sandpiper)                |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Tringa macularia</i>                             | 43.      |           |          |          |          | 1        | 2        |          |          | 1             |          |          | 1         |          |          |     |
| Schlammtreter (Willet)                              |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Catoptrophorus semipalmatus</i>                  | 44.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          | 4        | 3         |          |          |     |
| Steinwälzer (Ruddy Turnstone)                       |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Arenaria interpres</i>                           | 45.      |           |          |          |          | 3        |          |          |          |               | 3        | ~20      | ~20       |          |          |     |
| Kurzschnabel-Schlammläufer (Short-billed Dowitcher) |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Limnodromus griseus</i>                          | 46.      |           |          |          |          |          | 1        |          |          |               | 1        | ~30      | ~40       |          |          |     |
| Langschnabel-Schlammläufer (Long-billed Dowitcher)  |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Limnodromus scolopaceus</i>                      |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Knutt (Red Knot)                                    |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Calidris canutus</i>                             | 47.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          | ~30       |          |          |     |
| Sanderling (Sanderling)                             |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Calidris alba</i>                                | 48.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          | 6        | ~30       |          |          |     |
| Sandstrandläufer (Semipalmated Sandpiper)           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Calidris pusilla</i>                             | 49.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          | ~10      |           |          |          |     |
| Bergstrandläufer (Western Sandpiper)                |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Calidris mauri</i>                               | 50.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          | ~5       |           |          |          |     |
| Wiesenstrandläufer (Least Sandpiper)                |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Calidris minutilla</i>                           | 51.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          | ~30      |           |          |          |     |
| Weißbürzel-Strandläufer (White-rumped Sandpiper)    |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Calidris fuscicollis</i>                         |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Graubrust-Strandläufer (Pectoral Sandpiper)         |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Calidris melanotos</i>                           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Alpenstrandläufer (Dunlin)                          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Calidris alpina</i>                              | 52.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          | ~8       |           |          |          |     |
| Bindenstrandläufer (Stilt Sandpiper)                |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Micropalama himantopus</i>                       | 53.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               | 1        | 14       |           |          |          |     |
| <b>CICONIIFORMES: Jacanidae</b>                     |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Gelbstirnjassana (Northern Jacana)                  |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Jacana spinosa</i>                               | 54.      |           |          |          |          |          |          |          |          | 6             | 4        |          |           |          |          |     |
| <b>CICONIIFORMES: Charadriidae</b>                  |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Braunmantel-Austernfischer (American Oystercatcher) |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Haematopus palliatus</i>                         |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Schwarznacken-Stelzenläufer (Black-necked Stilt)    |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Himantopus mexicanus</i>                         | 55.      |           |          | 4        |          |          |          |          |          | 1             | 6        | 4        | ~50       |          |          |     |
| Wanderregenpfeifer (American Golden-Plover)         |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Pluvialis dominica</i>                           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Kiebitzregenpfeifer (Grey Plover)                   |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Pluvialis squatarola</i>                         | 56.      |           |          |          |          |          |          | 5        |          |               |          |          | ~20       | ~10      |          |     |
| Amerika Sandregenpfeifer (Semipalmated Plover)      |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Charadrius semipalmatus</i>                      | 57.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          | ~100      | ~10      |          |     |
| Dickschnabel-Regenpfeifer (Wilson's Plover)         |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Charadrius wilsonia</i>                          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Keilschwanz-Regenpfeifer (Killdeer)                 |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Charadrius vociferus</i>                         | 58.      |           |          | 2        |          | 2        | 1        | 3        | ~10      |               |          |          |           |          |          |     |
| Gelbfuß-Regenpfeifer (Piping Plover)                |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| <i>Charadrius melodus</i>                           | 59.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          | 3         | 1        |          |     |

|                                                                           | Fl.      | West Kuba |          |          |          | Zapata   |          |          |          | Sierra Najasa |          |                   | Caya Coco      |          |          | Fl. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------|-----|
|                                                                           | 08.03.10 | 09.03.10  | 10.03.10 | 11.03.10 | 12.03.10 | 13.03.10 | 14.03.10 | 15.03.10 | 16.03.10 | 17.03.10      | 18.03.10 | 19.03.10          | 20.03.10       | 21.03.10 | 22.03.10 |     |
| <b>Kuba</b>                                                               |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| <b>CICONIIFORMES: Laridae</b>                                             |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Schmarotzerraubmöwe (Parasitic Jaeger)<br><i>Stercorarius parasiticus</i> |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Spatelraubmöwe (Pomarine Jaeger)<br><i>Stercorarius pomarinus</i>         |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Schwarzmantel-Scherenschnabel (Black Skimmer)<br><i>Rynchops niger</i>    | 60.      |           |          |          |          |          | ~50      |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Delawarenmöwe (Ring-billed Gull)<br><i>Larus delawarensis</i>             | 61.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          | 2 ad.<br>+ 1 imm. |                |          |          |     |
| Mantelmöwe (Great Black-backed Gull)<br><i>Larus marinus</i>              |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Silbermöwe (Herring Gull)<br><i>Larus argentatus</i>                      |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Bonaparte-Möwe (Bonaparte's Gull)<br><i>Larus philadelphia</i>            |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Aztekenmöwe (Laughing Gull)<br><i>Larus atricilla</i>                     | 62.      |           |          |          |          |          |          |          |          |               | >30      | ~50               | ~50            |          |          |     |
| Schwalbenmöwe (Sabine's Gull)<br><i>Xema sabini</i>                       |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern)<br><i>Sterna nilotica</i>              |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Raubseeschwalbe (Caspian Tern)<br><i>Sterna caspia</i>                    | 63.      |           |          |          |          |          | ~70      |          |          |               | 3        |                   |                |          |          |     |
| Königsseeschwalbe (Royal Tern)<br><i>Sterna maxima</i>                    | 64.      |           |          |          |          |          | ~5       |          |          |               | >5       | ~20               | >10            |          |          |     |
| Brandseeschwalbe (Sandwich Tern)<br><i>Sterna sandvicensis</i>            |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Rosenseeschwalbe (Roseate Tern)<br><i>Sterna dougallii</i>                |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Flußseeschwalbe (Common Tern)<br><i>Sterna hirundo</i>                    |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Sumpfseeschwalbe (Forster's Tern)<br><i>Sterna forsteri</i>               |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Kleinstseeschwalbe (Least Tern)<br><i>Sterna antillarum</i>               |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Zügelseeschwalbe (Bridled Tern)<br><i>Sterna anaethetus</i>               |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Rußseeschwalbe (Sooty Tern)<br><i>Sterna fuscata</i>                      |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Trauerseeschwalbe (Black Tern)<br><i>Chlidonias niger</i>                 |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Noddi (Brown Noddy)<br><i>Anous stolidus</i>                              |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| <b>CICONIIFORMES: Accipitridae</b>                                        |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Fischadler (Osprey)<br><i>Pandion haliaetus</i>                           | 65.      |           |          | 1        |          | 2        | 3        | 1        | 1        |               | 9        | 1                 | 2 <sup>Ⓟ</sup> |          |          |     |
| Langschnabelweih (Hook-billed Kite)<br><i>Chondrohierax uncinatus</i>     |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Schwalbenweih (Swallow-tailed Kite)<br><i>Elanoides forficatus</i>        | 66.      |           |          |          |          |          |          | 1        |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Schneckenweih (Snail Kite)<br><i>Rostrhamus sociabilis</i>                | 67.      |           | 1        |          |          | 1w.      |          |          | 2M.      |               |          |                   |                |          |          |     |
| Kornweihe (Northern Harrier)<br><i>Circus cyaneus</i>                     | 68.      |           |          |          |          | 1w.      | 1w.      |          | 1w.      |               |          |                   |                |          |          |     |
| Eckschwanzsperber (Sharp-shinned Hawk)<br><i>Accipiter striatus</i>       |          |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Gundlach-Sperber (Gundlach's Hawk)<br><i>Accipiter gundlachi</i>          | 69.      |           |          |          |          |          |          |          | 1 imm.   |               |          |                   |                |          |          |     |
| Krabbenbussard (Common Black-Hawk)<br><i>Buteogallus anthracinus</i>      | 70.      |           |          |          |          |          | 3        |          |          |               | 1        | ~4                | 1              |          |          |     |
| Breitflügelbussard (Broad-winged Hawk)<br><i>Buteo platypterus</i>        | 71.      |           | 6        | 1        |          | 2        | 3        | 2        |          |               |          |                   |                |          |          |     |
| Rotschwanzbussard (Red-tailed Hawk)<br><i>Buteo jamaicensis</i>           | 72.      |           |          | 1        |          | 1        | 1+       | 2        |          | 1             |          |                   |                |          |          |     |

Ⓟ auch die lokale, sehr hellköpfige Unterart

|                                                   | Fl.      | West Kuba |          |                  |          | Zapata   |                   |          |          | Sierra Najasa |              |                  | Caya Coco |          |          | Fl. |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------------|--------------|------------------|-----------|----------|----------|-----|
|                                                   | 08.03.10 | 09.03.10  | 10.03.10 | 11.03.10         | 12.03.10 | 13.03.10 | 14.03.10          | 15.03.10 | 16.03.10 | 17.03.10      | 18.03.10     | 19.03.10         | 20.03.10  | 21.03.10 | 22.03.10 |     |
| Kuba                                              |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| CICONIIFORMES: Falconidae                         |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Schopf-Karakara (Crested Caracara)                |          |           |          |                  |          |          |                   | 2        | 3        | 2             | 1            | 4                |           |          |          |     |
| <i>Caracara cheriway</i>                          | 73.      |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Buntfalke (American Kestrel)                      | 74.      |           | 4        | 2                | ~15      | 6        | ~10               | ~10      | ~10      | x             | 5            | 3                | 1         | 1        |          |     |
| <i>Falco sparverius</i>                           |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Merlin (Merlin)                                   | 75.      |           |          |                  |          | 1w.      | 1w.               |          |          |               | 1M.<br>+ 1w. | 1+1              |           |          |          |     |
| <i>Falco columbarius</i>                          |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Wanderfalke (Peregrine Falcon)                    |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          | 1+            | 1            |                  |           |          |          |     |
| <i>Falco peregrinus</i>                           |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| CICONIIFORMES: Podicipedidae                      |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Schwarzkopftaucher (Least Grebe)                  | 76.      |           | 1        |                  |          |          |                   |          |          | 1             |              |                  |           |          |          |     |
| <i>Tachybaptus dominicus</i>                      |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Bindentaucher (Pied-billed Grebe)                 | 77.      |           |          |                  |          |          |                   |          |          | 4             |              |                  |           |          |          |     |
| <i>Podilymbus podiceps</i>                        |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| CICONIIFORMES: Phaethontidae                      |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Rotschnabel-Tropikvogel (Red-billed Tropicbird)   |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| <i>Phaethon aethereus</i>                         |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Weißschwanz-Tropikvogel (White-tailed Tropicbird) |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| <i>Phaethon lepturus</i>                          |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| CICONIIFORMES: Sulidae                            |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Basstölpel (Northern Gannet)                      |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| <i>Morus bassanus</i>                             |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Maskentölpel (Masked Booby)                       |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| <i>Sula dactylatra</i>                            |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Rotfußtölpel (Red-footed Booby)                   |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| <i>Sula sula</i>                                  |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Brauntölpel (Brown Booby)                         |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| <i>Sula leucogaster</i>                           |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| CICONIIFORMES: Anhingidae                         |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Anhinga (Anhinga)                                 | 78.      |           |          |                  |          |          |                   | 1        |          |               | 22           | 1                |           |          |          |     |
| <i>Anhinga anhinga</i>                            |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| CICONIIFORMES: Phalacrocoracidae                  |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Olivenscharbe (Neotropic Cormorant)               | 79.      |           |          |                  |          |          | 2                 | ~100     |          |               | 1            | 1                |           |          |          |     |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i>                  |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Ohrenscharbe (Double-crested Cormorant)           | 80.      |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               | ~10          | ~5               | 1         |          |          |     |
| <i>Phalacrocorax auritus</i>                      |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| CICONIIFORMES: Ardeidae                           |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Indianerdommel (Least Bittern)                    |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| <i>Ixobrychus exilis</i>                          |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Nordamerikanische Rohrdommel (American Bittern)   |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| <i>Botaurus lentiginosus</i>                      |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Krabbenreiher (Yellow-crowned Night-Heron)        | 81.      |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              | 3 ad<br>+ 1 imm. |           |          |          |     |
| <i>Nyctanassa violacea</i>                        |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron)           | 82.      |           |          |                  |          |          | 1 ad,<br>+ 1 imm. | 1        |          | 1 imm.        | 1 ad         |                  |           |          |          |     |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>                      |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Rötelreiher (Reddish Egret)                       | 83.      |           |          |                  |          |          |                   | ~7       |          |               |              | ~5               | 1         |          |          |     |
| <i>Egretta rufescens</i>                          |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Rötelreiher (weiß) (Reddish Egret)                |          |           |          |                  |          |          |                   | ~10      |          |               |              | 1                |           |          |          |     |
| <i>Egretta rufescens</i>                          |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Dreifarbenreiher (Tricolored Heron)               | 84.      |           |          | 1                |          |          |                   | 4        | 1        |               |              | 2                | ~5        | 1        |          |     |
| <i>Egretta tricolor</i>                           |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Blaureiher (Little Blue Heron)                    | 85.      |           | 1        | 2 ad<br>+ 2 imm. | ~10      |          | ~10               | 5        | 1        | 2             | 3            | ~5               | ~5        | 3        |          |     |
| <i>Egretta caerulea</i>                           |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Schmuckreiher (Snowy Egret)                       | 86.      |           | 1        | 3                | 2        |          |                   | 5        | ~20      | 1             |              | ~10              | 1         | 1        |          |     |
| <i>Egretta thula</i>                              |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Kanadareiher (Great Blue Heron)                   | 87.      |           |          |                  | 1        |          |                   | 2        | 2        | 2             | 1            | ~3               | ~20       |          |          |     |
| <i>Ardea herodias</i>                             |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Kanadareiher (weiß) (Great Blue Heron)            |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  | 1         | 1        |          |     |
| <i>Ardea herodias</i>                             |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |
| Silberreiher (Great Egret)                        | 88.      |           | 1        | 2                | 5        |          |                   | 1        | 2        | 5             | 1            | 1                | ~5        | ~10      |          |     |
| <i>Ardea alba</i>                                 |          |           |          |                  |          |          |                   |          |          |               |              |                  |           |          |          |     |

⊕ 2x intermediär (weißköpfig)

|                                                                              | FI  | West Kuba |          |          |          | Zapata            |          |          |          | Sierra Najasa |                 |          | Caya Coco |          |          | FI |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|----|
|                                                                              |     | 08.03.10  | 09.03.10 | 10.03.10 | 11.03.10 | 12.03.10          | 13.03.10 | 14.03.10 | 15.03.10 | 16.03.10      | 17.03.10        | 18.03.10 | 19.03.10  | 20.03.10 | 21.03.10 |    |
| <b>Kuba</b>                                                                  |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Kuhreiher (Cattle Egret)<br><i>Bubulcus ibis</i>                             | 89. |           | ~100     | >100     | >500     | ~10               | ~20      | ~10      | ~20      | 1.000         | >50             | X        |           |          |          |    |
| Grünreiher (Green Heron)<br><i>Butorides virescens</i>                       | 90. |           | 2        |          |          |                   |          | 1        |          |               | 3               | 3        | 3         |          |          |    |
| <b>CICONIIFORMES: Phoenicopteridae</b>                                       |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Flamingo (Greater Flamingo)<br><i>Phoenicopterus ruber</i>                   | 91. |           |          |          |          |                   |          | ~150     |          |               | großer<br>Trupp | ~10      |           |          |          |    |
| <b>CICONIIFORMES: Threskiornithidae</b>                                      |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Schneesichler (White Ibis)<br><i>Eudocimus albus</i>                         | 92. |           |          |          |          | 1 ad.<br>+ 3 imm. | >100     |          |          | 1             |                 | ~40      | 6         |          |          |    |
| Scharlachsichler (Scarlet Ibis)<br><i>Eudocimus ruber</i>                    |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Rosalöffler (Roseate Spoonbill)<br><i>Ajaia ajaja</i>                        | 93. |           |          |          |          |                   |          | ~40      |          |               |                 | ~5       | 1         |          |          |    |
| <b>CICONIIFORMES: Pelecanidae</b>                                            |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Braunpelikan (Brown Pelican)<br><i>Pelecanus occidentalis</i>                | 94. |           |          |          | ~10      | 1 ad.             |          |          |          |               | 2 ad.           | 5        | 8         | 3        |          |    |
| <b>CICONIIFORMES: Ciconiidae</b>                                             |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Rabengeier (Black Vulture)<br><i>Coragyps atratus</i>                        |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Truthahngeier (Turkey Vulture)<br><i>Cathartes aura</i>                      | 95. |           | X        | X        | X        | X                 | X        | X        | X        | X             | X               | X        | X         | X        | X        |    |
| Waldstorch (Wood Stork)<br><i>Mycteria americana</i>                         |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| <b>CICONIIFORMES: Fregatidae</b>                                             |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Prachtfregattvogel (Magnificent Frigatebird)<br><i>Fregata magnificens</i>   | 96. |           |          |          |          | 3                 | 1        | ~5       |          |               |                 | 1        | ~20       | ~10      | 1        |    |
| <b>CICONIIFORMES: Gaviidae</b>                                               |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Eistaucher (Common Loon)<br><i>Gavia immer</i>                               |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| <b>CICONIIFORMES: Procellariidae</b>                                         |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Teufelsturmvogel (Black-capped Petrel)<br><i>Pterodroma hasitata</i>         |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Gelbschnabel-Sturmtaucher (Cory's Shearwater)<br><i>Calonectris diomedea</i> |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| DunklerSturmtaucher (Sooty Shearwater)<br><i>Puffinus griseus</i>            |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Schuppensturmtaucher (Audubon's Shearwater)<br><i>Puffinus lherminieri</i>   |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Buntfuß-Sturmschwalbe (Wilson's Storm-Petrel)<br><i>Oceanites oceanicus</i>  |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Madeirawellenläufer (Band-rumped Storm-Petrel)<br><i>Oceanodroma castro</i>  |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Wellenläufer (Leach's Storm-Petrel)<br><i>Oceanodroma leucorhoa</i>          |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| <b>PASSERIFORMES: Tyrannidae</b>                                             |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| WestlicherWaldtyrann (Western Wood-Pewee)<br><i>Contopus sordidulus</i>      |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| ÖstlicherWaldtyrann (Eastern Wood-Pewee)<br><i>Contopus virens</i>           |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Braunbauchtyrann (Cuban Pewee)<br><i>Contopus caribaeus</i>                  | 97. |           | 1        | 3        |          | 3                 |          | 1        |          |               | 1               |          |           |          |          |    |
| Birkentyrann (Yellow-bellied Flycatcher)<br><i>Empidonax flaviventris</i>    |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Buchentyrann (Acadian Flycatcher)<br><i>Empidonax virescens</i>              |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Erlentyrann (Alder Flycatcher)<br><i>Empidonax alnorum</i>                   |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |
| Weidentyrann (Willow Flycatcher)<br><i>Empidonax traillii</i>                |     |           |          |          |          |                   |          |          |          |               |                 |          |           |          |          |    |

|                                                                         | Fl.      | West Kuba |             |              |          | Zapata   |          |            |          | Sierra Najasa |          |          | Caya Coco   |          |          | Fl. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|----------|----------|------------|----------|---------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-----|
|                                                                         | 08.03.10 | 09.03.10  | 10.03.10    | 11.03.10     | 12.03.10 | 13.03.10 | 14.03.10 | 15.03.10   | 16.03.10 | 17.03.10      | 18.03.10 | 19.03.10 | 20.03.10    | 21.03.10 | 22.03.10 |     |
| <b>Kuba</b>                                                             |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Schnäppertyrann (Great Crested Flycatcher)<br><i>Myiarchus crinitus</i> |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Sagra-Tyrann (La Sagra's Flycatcher)<br><i>Myiarchus sagrae</i>         | 98.      |           | 4           |              | 2        |          | 1        | 1          |          | ~4            | 3        | 2        | 1           |          |          |     |
| Scherentyrann (Scissor-tailed Flycatcher)<br><i>Tyrannus forficatus</i> |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Königstyrann (Eastern Kingbird)<br><i>Tyrannus tyrannus</i>             |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Grautyrann (Grey Kingbird)<br><i>Tyrannus dominicensis</i>              |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Bahamatyrann (Loggerhead Kingbird)<br><i>Tyrannus caudifasciatus</i>    | 99.      |           | 3           | ~7           | >10      | 2        | 3        | 3          | 1        |               | 2        |          | 1           | 2        |          |     |
| Kubatyran (Giant Kingbird)<br><i>Tyrannus cubensis</i>                  | 100.     |           | 1           |              |          |          |          |            |          |               | >10      |          |             |          |          |     |
| <b>PASSERIFORMES: Vireonidae</b>                                        |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Weißaugenvireo (White-eyed Vireo)<br><i>Vireo griseus</i>               |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Kuba-Vireo (Cuban Vireo)<br><i>Vireo gundlachii</i>                     | 101.     |           | 1           |              | 2        |          |          | 1<br>+3ruf |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Dickschnabelvireo (Thick-billed Vireo)<br><i>Vireo crassirostris</i>    | 102.     |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          | 2<br>+4sing |          |          |     |
| Graukopfvireo (Blue-headed Vireo)<br><i>Vireo solitarius</i>            |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Gelbkhehlvireo (Yellow-throated Vireo)<br><i>Vireo flavifrons</i>       |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Schlichtvireo (Philadelphia Vireo)<br><i>Vireo philadelphicus</i>       |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Rotaugenvireo (Red-eyed Vireo)<br><i>Vireo olivaceus</i>                |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Bartvireo (Black-whiskered Vireo)<br><i>Vireo altiloquus</i>            | 103.     |           |             |              |          |          |          |            |          |               | 1        |          |             |          |          |     |
| Sängervireo (Eastern Warbling-Vireo)<br><i>Vireo gilvus</i>             |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| <b>PASSERIFORMES: Corvidae</b>                                          |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Kubakrähe (Cuban Crow)<br><i>Corvus nasicus</i>                         | 104.     |           |             | 1            |          | 2        | 1        |            |          | ~50           | ~10      |          |             |          |          |     |
| Palmenkrähe (Palm Crow)<br><i>Corvus palmarum</i>                       | 105.     |           |             |              |          |          |          |            |          | ~15           | 1        |          |             |          |          |     |
| <b>PASSERIFORMES: Bombycillidae</b>                                     |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Zedernseidenschwanz (Cedar Waxwing)<br><i>Bombycilla cedrorum</i>       |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| <b>PASSERIFORMES: Muscicapidae</b>                                      |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Rotkehl-Hüttensänger (Eastern Bluebird)<br><i>Sialia sialis</i>         |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Kubaklarino (Cuban Solitaire)<br><i>Myadestes elisabeth</i>             | 106.     |           | 1+<br>2sing | 3+<br>10sing |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Wilson-Drossel (Veery)<br><i>Catharus fuscescens</i>                    |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Grauwangendrossel (Grey-cheeked Thrush)<br><i>Catharus minimus</i>      |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Bicknelldrossel (Bicknell's Thrush)<br><i>Catharus bicknelli</i>        |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Zwergdrossel (Swainson's Thrush)<br><i>Catharus ustulatus</i>           |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Walddrossel (Wood Thrush)<br><i>Catharus mustelinus</i>                 |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
| Rottfußdrossel (Red-legged Thrush)<br><i>Turdus plumbeus</i>            | 107.     |           | 7           | 2            | 2        | 6        | 1        |            | ~5       | 1             | 1        | 3        | 1           | 3        |          |     |
| Wanderdrossel (American Robin)<br><i>Turdus migratorius</i>             |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
|                                                                         |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |
|                                                                         |          |           |             |              |          |          |          |            |          |               |          |          |             |          |          |     |

# Kuba

## PASSERIFORMES: Sturnidae

|                                            |      |  |     |    |     |     |     |    |   |   |   |    |     |     |  |  |  |
|--------------------------------------------|------|--|-----|----|-----|-----|-----|----|---|---|---|----|-----|-----|--|--|--|
| Katzendrossel (Grey Catbird)               | 108. |  |     | 5  |     | 3   | ~5  | ~5 | 1 |   |   |    |     |     |  |  |  |
| <i>Dumetella carolinensis</i>              |      |  |     |    |     |     |     |    |   |   |   |    |     |     |  |  |  |
| Spottdrossel (Northern Mockingbird)        | 109. |  | ~10 | ~5 | >50 | >10 | >20 | X  | X | X | X | ~5 | >10 | ~10 |  |  |  |
| <i>Mimus polyglottos</i>                   |      |  |     |    |     |     |     |    |   |   |   |    |     |     |  |  |  |
| Gundlach-Spottdrossel (Bahama Mockingbird) | 110. |  |     |    |     |     |     |    |   |   |   |    | 1   |     |  |  |  |
| <i>Mimus gundlachii</i>                    |      |  |     |    |     |     |     |    |   |   |   |    |     |     |  |  |  |

## PASSERIFORMES: Certhiidae

|                                          |      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
|------------------------------------------|------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Kubazaunkönig (Zapata Wren)              | 111. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
| <i>Ferminia cerverai</i>                 |      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
| Hauszaunkönig (House Wren)               |      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
| <i>Troglodytes aedon</i>                 |      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
| Blaumückenfänger (Blue-grey Gnatcatcher) | 112. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
| <i>Poliophtila caerulea</i>              |      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
| Kubamückenfänger (Cuban Gnatcatcher)     | 113. |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |
| <i>Poliophtila lembeyei</i>              |      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |

## PASSERIFORMES: Hirundinidae

|                                                          |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|--|------|--|--|----|-----|--|---|--|--|--|-----|--|--|--|--|
| Sumpfschwalbe (Tree Swallow)                             | 114. |  |      |  |  | >5 | >50 |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <i>Tachycineta bicolor</i>                               |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Bahamaschwalbe (Bahama Swallow)                          |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <i>Tachycineta cyaneoviridis</i>                         |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Purpurschwalbe (Purple Martin)                           |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <i>Progne subis</i>                                      |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Kubaschwalbe (Cuban Martin)                              | 115. |  |      |  |  | >2 | ~10 |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <i>Progne cryptoleuca</i>                                |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Nord- Rauhfügelsschwalbe (Northern Rough-winged Swallow) |      |  |      |  |  | ~5 |     |  | 1 |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <i>Stelgidopteryx serripennis</i>                        | 116. |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Uferschwalbe (Sand Martin)                               |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <i>Riparia riparia</i>                                   |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Rauchschwalbe (Barn Swallow)                             |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <i>Hirundo rustica</i>                                   |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Fahlstirnschwalbe (Cliff Swallow)                        |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| <i>Hirundo pyrrhonota</i>                                |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Höhlschwalbe (Cave Swallow)                              | 117. |  | >100 |  |  |    |     |  |   |  |  |  | ~20 |  |  |  |  |
| <i>Hirundo fulva</i>                                     |      |  |      |  |  |    |     |  |   |  |  |  |     |  |  |  |  |

## PASSERIFORMES: Passeridae

|                                        |      |  |  |  |     |  |  |   |   |    |     |     |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------|--|--|--|-----|--|--|---|---|----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| Hausperling (House Sparrow)            | 118. |  |  |  | >10 |  |  | 1 | 5 | >5 | ~10 | 1,2 |  |  |  |  |  |
| <i>Passer domesticus</i>               |      |  |  |  |     |  |  |   |   |    |     |     |  |  |  |  |  |
| Schwarzbauchnonne (Black-headed Munia) |      |  |  |  |     |  |  |   |   |    |     |     |  |  |  |  |  |
| <i>Lonchura malacca</i>                |      |  |  |  |     |  |  |   |   |    |     |     |  |  |  |  |  |

## PASSERIFORMES: Fringillidae

|                                               |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Goldzeisig (American Goldfinch)               |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Carduelis tristis</i>                      |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mexikanerzeisig (Lesser Goldfinch)            |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Carduelis psaltria</i>                     |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lincoln-Ammer (Lincoln's Sparrow)             |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Melospiza lincolni</i>                     |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dachsammer (White-crowned Sparrow)            |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Zonotrichia leucophrys</i>                 |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grasammer (Savannah Sparrow)                  |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Passerculus sandwichensis</i>              |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heuschreckenammer (Grasshopper Sparrow)       |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Ammodramus savannarum</i>                  |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fahlammer (Clay-colored Sparrow)              |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Spizella pallida</i>                       |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapataammer (Zapata Sparrow)                  | 119. |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Torreornis inexpectata</i>                 |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gelbstirn-Waldsänger (Bachman's Warbler)      |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Vermivora bachmanii</i>                    |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blaufügel-Waldsänger (Blue-winged Warbler)    |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Vermivora pinus</i>                        |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Goldflügel-Waldsänger (Golden-winged Warbler) |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Vermivora chrysoptera</i>                  |      |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

⊕ 1 am Nest

|                                                                                      | Fl.  | West Kuba |          |          |          | Zapata   |          |          |          | Sierra Najasa |          |          | Caya Coco |          |          | Fl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----|
|                                                                                      |      | 08.03.10  | 09.03.10 | 10.03.10 | 11.03.10 | 12.03.10 | 13.03.10 | 14.03.10 | 15.03.10 | 16.03.10      | 17.03.10 | 18.03.10 | 19.03.10  | 20.03.10 | 21.03.10 |     |
| <b>Kuba</b>                                                                          |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Brauenwaldsänger (Tennessee Warbler)<br><i>Vermivora peregrina</i>                   | 120. |           |          |          |          |          |          |          |          |               | 1        |          |           |          |          |     |
| Meisenwaldsänger (Northern Parula)<br><i>Parula americana</i>                        | 121. |           |          | 3        |          | 4        | 1        | 1        |          |               | >5       |          | 1         | 2        |          |     |
| Goldwaldsänger (Yellow Warbler)<br><i>Dendroica petechia</i>                         | 122. |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          | 3         | 1        |          |     |
| Gelbscheitel-Waldsänger (Chestnut-sided Warbler)<br><i>Dendroica pensylvanica</i>    |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Hemlock-Waldsänger (Magnolia Warbler)<br><i>Dendroica magnolia</i>                   | 123. |           |          |          |          | 1w.      |          |          |          |               | 1        |          |           |          |          |     |
| Tigerwaldsänger (Cape May Warbler)<br><i>Dendroica tigrina</i>                       | 124. |           |          |          |          |          |          |          |          |               | 1m.      |          | 1         | 2        |          |     |
| Blaurücken-Waldsänger (Black-throated Blue Warbler)<br><i>Dendroica caerulescens</i> | 125. |           |          | 1m.      |          | 1m.      |          |          |          |               | 2        | >5       |           | 1        |          |     |
| Kronwaldsänger (Yellow-rumped Warbler)<br><i>Dendroica coronata</i>                  |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Grünwaldsänger (Black-throated Green Warbler)<br><i>Dendroica virens</i>             | 126. |           |          | 1m.      |          | 1m.      |          | 1m.      | 1        |               |          |          |           |          |          |     |
| Fichtenwaldsänger (Blackburnian Warbler)<br><i>Dendroica fusca</i>                   |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Goldkehl-Waldsänger (Yellow-throated Warbler)<br><i>Dendroica dominica</i>           | 127. |           |          |          |          | 1        | 1        | 1        | 2        | 1             | ~3       |          | 1         | 1        |          |     |
| Kubawaldsänger (Olive-capped Warbler)<br><i>Dendroica pityophila</i>                 | 128. |           |          | 2        | 6        |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Rostscheitel-Waldsänger (Prairie Warbler)<br><i>Dendroica discolor</i>               | 129. |           |          |          |          |          | 1        |          |          |               | 2        | 2        | 1         |          |          |     |
| Sumpfwaldsänger (Palm Warbler)<br><i>Dendroica palmarum</i>                          | 130. |           |          | 3        | ~5       | 1 PK     | 7        | >5       |          |               |          | 2        | ~5        | ~5       |          |     |
| Braunbrust-Waldsänger (Bay-breasted Warbler)<br><i>Dendroica castanea</i>            |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Kappenwaldsänger (Blackpoll Warbler)<br><i>Dendroica striata</i>                     |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Pappelwaldsänger (Cerulean Warbler)<br><i>Dendroica cerulea</i>                      |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Kletterwaldsänger (Black-and-white Warbler)<br><i>Mniotilta varia</i>                | 131. |           |          |          |          | 1        |          |          | 1        |               | 2        |          |           |          |          |     |
| Schnäpperwaldsänger (American Redstart)<br><i>Setophaga ruticilla</i>                | 132. |           |          | 1m.      | 1,2      |          | 1,2      | 2,2      | 1w.      |               | ~10      |          |           | 1m.      |          |     |
| Zitronenwaldsänger (Prothonotary Warbler)<br><i>Protonotaria citrea</i>              |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Haldenwaldsänger (Worm-eating Warbler)<br><i>Helmitheros vermivorus</i>              |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Swainson-Waldsänger (Swainson's Warbler)<br><i>Limnithlypis swainsonii</i>           |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Pieperwaldsänger (Ovenbird)<br><i>Seiurus aurocapillus</i>                           | 133. |           |          |          |          | 3        | 1        |          | 3        | 1             |          | 1        |           | 2        |          |     |
| Uferwaldsänger (Northern Waterthrush)<br><i>Seiurus noveboracensis</i>               | 134. |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          | 1        | 2         | 1        |          |     |
| Stelzenwaldsänger (Louisiana Waterthrush)<br><i>Seiurus motacilla</i>                | 135. |           |          | 1        |          |          |          |          |          |               | 5        | 1        |           |          |          |     |
| Kentuckywaldsänger (Kentucky Warbler)<br><i>Oporornis formosus</i>                   |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Weidengelbkehlchen (Common Yellowthroat)<br><i>Geothlypis trichas</i>                | 136. |           |          | 1        |          |          | 3M       | 1        | 1        |               |          |          | 1         |          |          |     |
| Gelbkopf-Waldsänger (Yellow-headed Warbler)<br><i>Teretistris fernandinae</i>        | 137. |           |          | 3        | >3       |          | >5       | 3        | ~5       |               |          |          |           |          |          |     |
| Forns-Waldsänger (Oriente Warbler)<br><i>Teretistris fornsi</i>                      | 138. |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          | 3         | 1        |          |     |
| Kapuzen-Waldsänger (Hooded Warbler)<br><i>Wilsonia citrina</i>                       |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Mönchswaldsänger (Wilson's Warbler)<br><i>Wilsonia pusilla</i>                       |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Kanadawaldsänger (Canada Warbler)<br><i>Wilsonia canadensis</i>                      |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Gelbbrust-Waldsänger (Yellow-breasted Chat)<br><i>Icteria virens</i>                 |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |
| Zuckervogel (Bananaquit)<br><i>Coereba flaveola</i>                                  |      |           |          |          |          |          |          |          |          |               |          |          |           |          |          |     |

